

Antwort der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl,
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/4049 –**

Krankenstände in Deutschland

Vorbemerkung der Fragesteller

Die gesundheitlichen Belastungen von Beschäftigten steigen seit Jahren an, nicht erst seitdem die Digitalisierung der Arbeitswelt in aller Munde ist. Arbeitsverdichtung, Entgrenzung und zunehmender Stress machen den arbeitenden Menschen in Deutschland zu schaffen. Sie sind Arbeitshetze und ständigen Bewährungsproben ausgesetzt, die Erholung und Wohlbefinden beeinträchtigen. Immer häufiger führt dies dazu, dass Beschäftigte krank werden und nicht zur Arbeit gehen können. Eine Studie der Betriebskrankenkassen zeigt, dass die Fehltage von Beschäftigten ansteigen: Im Jahr 2016 war jeder Beschäftigte durchschnittlich 17 Tage krank, während es 2006 nur elf Tage waren (vgl. BKK Gesundheitsreport 2017). Psychische Belastungen tragen immer stärker zu dieser Entwicklung bei. Alleine zwischen 2012 und 2016 sind die Zahl der stressbedingten Fehltage von knapp 20 Millionen auf mehr als 30 Millionen pro Jahr gestiegen, wie die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 91 auf Bundestagsdrucksache 19/1979 ergeben hat.

Es sind vor allem bestimmte Diagnosen, wie Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems und psychische Erkrankungen, die zu langen Krankschreibungen führen, worauf die Studie der DAK-Gesundheit (DAK-Gesundheitsreport 2018) hinweist. Im Jahr 2017 ging jeder fünfte Arbeitsunfähigkeitstag auf Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems und jeder sechste auf psychische Erkrankungen zurück. Zudem gehen immer mehr Beschäftigte krank zur Arbeit. Rückenschmerzen waren 2017 die zweitwichtigste Einzeldiagnose unter den Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Jedoch ging nicht einmal jeder dritte, der in den letzten zwölf Monaten unter Rückenschmerzen litt, zum Arzt. Auch zeigt die Studie, dass Betroffene von Rückenschmerzen, die öfter an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten, sich mit 30 bis 50 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit krankmelden, als Beschäftigte, die fast nie an der Grenze der Leistungsfähigkeit arbeiten. Unter dem Strich verdichtet sich der Eindruck, dass krankmachende Arbeitsbedingungen ein zunehmendes Problem in Deutschland darstellen und es stellt sich die Frage nach dem Ausmaß dieser Entwicklung.

Vorbemerkung der Bundesregierung

Die von den Fragestellern aufgestellte Vermutung, dass in Deutschland zunehmend krankmachenden Arbeitsbedingungen herrschten, wird von der Bundesregierung nicht geteilt. Zum einen darf bei der Betrachtung der Arbeitsunfähigkeit nicht außer Acht gelassen werden, dass für die physische und psychische Gesundheit neben dem Arbeitsumfeld zahlreiche andere Einflussfaktoren eine wesentliche Rolle spielen. Zum anderen wird von den Fragestellern außer Acht gelassen, dass – auch aufgrund zahlreicher Maßnahmen der Bundesregierung – die Betriebe zunehmend Aktivitäten zur Gesundheitsförderung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unternehmen.

Bei der Bewertung der Entwicklung der Zahl an Arbeitsunfähigkeitsfällen in den letzten 20 Jahren ist zu berücksichtigen, dass die Erwerbstätigkeit in diesem Zeitraum deutlich zugenommen hat und alleine schon deswegen die Zahl der Fälle gestiegen ist. Hinzu kommt eine überdurchschnittlich gestiegene Erwerbsbeteiligung Älterer, was sich statistisch in der Zahl der Fehltage niederschlägt. So dauert nach der amtlichen Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung beispielsweise die Arbeitsunfähigkeit für 60- bis 64-Jährige durchschnittlich mehr als doppelt so lange wie für 35- bis 39-Jährige.

Es liegt im originären Eigeninteresse der Betriebe, die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit in alternden Belegschaften dauerhaft zu erhalten. Dem kommen viele Betriebe durch spezielle Maßnahmen zur Gesundheitsförderung für ältere Beschäftigte nach. Die Bundesregierung und die Sozialversicherungsträger unterstützen die Betriebe dabei in vielfältiger Art und Weise. So bieten die Krankenkassen Unterstützung bei der Einführung und der Umsetzung betrieblicher Gesundheitsförderung und die Träger der Rentenversicherung im Einzelfall durch Leistungen der medizinischen Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Durch das Präventionsgesetz wurden die Leistungen der Krankenkassen zur betrieblichen Gesundheitsförderung erheblich ausgeweitet. So gaben die Krankenkassen im Jahr 2017 über 158 Mio. Euro für Leistungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung aus. Im Jahr 2015 waren dies noch 76,2 Mio. Euro. Mit dem am 1. August 2018 von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals soll die Möglichkeit für die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen verbessert werden, Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung anzubieten, um so die physischen und psychischen gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten der Beschäftigten gleichermaßen zu stärken. Bei der Ein- und Durchführung betrieblicher Gesundheitsförderung sollen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen verstärkt mit Leistungen der Krankenkassen unterstützt werden. Die Krankenkassen sollen hierfür zusätzlich mehr als 70 Mio. Euro jährlich aufwenden.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert zudem beispielsweise die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), in der sich Bund, Länder, Sozialpartner und Kammern, die Bundesagentur für Arbeit, Unternehmen, Sozialversicherungsträger und Stiftungen gemeinsam für die Gestaltung guter Arbeit einsetzen.

Die amtliche Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung zeigt, dass Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Bei der Betrachtung dieser Entwicklung ist jedoch zu berücksichtigen, dass aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz von psychischen Erkrankungen und des Rückgangs von Stigmatisierungen aufgrund einer psychischen Erkrankung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zunehmend die Möglichkeit sehen, diese als Grundlage für eine Arbeitsunfähigkeit anzugeben. Den zunehmenden Ausfällen aufgrund psychischer Erkrankungen begegnen

viele Betriebe mit entsprechenden Maßnahmen. Beispielsweise wurde im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) eine Vielzahl von Maßnahmen im Bereich der Sensibilisierung, Information, Qualifizierung sowie Beratung und Überwachung zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung bei arbeitsbedingten psychischen Belastungen initiiert und umgesetzt. Nähere Details hierzu sind der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. zum Thema „Psychische Belastungen in der Arbeitswelt“ auf Bundestagsdrucksache 19/3895 zu entnehmen.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Studien einzelner gesetzlicher Krankenversicherungen und des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen (WIdO) für die Kassenart Ortskrankenkassen nur jeweils einen Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland betrachten. Sie analysieren die Art und den Grund der Arbeitsunfähigkeit ihrer eigenen Mitglieder. Die Einzeldaten, auf denen diese Studien basieren, liegen der Bundesregierung nicht vor. Eine vollständige Erfassung der Arbeitsunfähigkeit von gesetzlich Versicherten in Deutschland erfolgt im Rahmen der amtlichen Statistik KG 8. Hier werden die Arbeitsunfähigkeitsfälle und die Arbeitsunfähigkeitstage nach Alter, Geschlecht und Diagnosen unterschieden. Kennzeichen wie Branche, Betriebsgröße oder Arbeitsbereich des erkrankten Mitgliedes werden dagegen nicht erfasst und können daher nicht ausgewertet werden. Auch das Bundesland, in dem das Mitglied wohnt, wird nicht erfasst.

1. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung hinsichtlich der Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 vor (bitte gesondert für Bundesländer, Branchen, Betriebsgrößen, Alter und Geschlecht ausweisen)?

Die Arbeitsunfähigkeitstage nach Alter und Geschlecht für die Jahre 2008, 2013, 2014, 2015 und 2016 sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Für die Jahre davor ist eine entsprechende Angabe nicht möglich. Die Ergebnisse für die Jahre 2017 und 2018 liegen noch nicht vor. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

Arbeitsunfähigkeitstage der Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

Alter von	2008	
	Frauen	Männer
bis unter 15	1.809	1.478
15 bis unter 20	2.857.813	3.728.301
20 bis unter 25	10.014.093	10.879.910
25 bis unter 30	10.936.264	10.982.026
30 bis unter 35	11.234.007	11.436.637
35 bis unter 40	15.154.802	15.674.429
40 bis unter 45	22.290.129	21.263.785
45 bis unter 50	26.785.003	24.915.482
50 bis unter 55	27.725.372	25.993.520
55 bis unter 60	26.850.777	27.804.294
60 bis unter 65	10.328.187	15.729.133
65 bis unter 70	424.855	1.149.646
70 bis unter 75	34.882	81.247
75 bis unter 80	13.008	28.020
80 und älter	9.975	12.974
Zusammen	164.660.976	169.680.882

Alter von	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
bis unter 15	396	419	409	456
15 bis unter 20	3.569.685	4.681.762	3.454.210	4.489.841
20 bis unter 25	13.412.679	14.332.080	12.605.056	13.403.244
25 bis unter 30	16.615.606	15.839.126	16.581.420	15.638.673
30 bis unter 35	17.628.554	17.923.550	17.393.535	16.969.579
35 bis unter 40	17.607.906	17.542.792	17.646.454	17.100.832
40 bis unter 45	23.958.341	23.175.978	21.889.120	20.931.344
45 bis unter 50	35.216.742	31.544.466	32.286.324	29.446.249
50 bis unter 55	38.756.154	34.657.675	37.195.315	34.285.320
55 bis unter 60	34.041.755	34.427.020	33.667.689	33.790.061
60 bis unter 65	18.770.961	24.496.945	20.967.213	25.361.249
65 bis unter 70	684.560	1.083.024	860.593	1.369.391
70 bis unter 75	34.290	73.934	29.632	73.943
75 bis unter 80	12.844	33.753	12.186	33.419
80 und älter	8.705	14.256	9.052	16.789
Zusammen	220.319.178	219.826.780	214.598.208	212.910.390

Alter von	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
bis unter 15	292	608	38.151	19.145
15 bis unter 20	3.867.739	5.042.441	3.847.245	5.055.329
20 bis unter 25	13.592.118	14.752.628	13.541.264	14.779.204
25 bis unter 30	19.652.938	18.853.319	20.528.575	20.011.505
30 bis unter 35	20.690.489	20.392.562	21.952.920	21.773.645
35 bis unter 40	21.910.993	21.592.073	23.627.682	23.693.751
40 bis unter 45	25.463.837	24.655.627	25.732.977	25.147.706
45 bis unter 50	38.344.003	35.578.258	39.039.547	36.216.366
50 bis unter 55	46.310.123	43.300.243	49.319.473	46.469.006
55 bis unter 60	42.460.489	43.606.837	46.477.883	48.084.644
60 bis unter 65	27.503.472	31.604.635	31.861.052	35.754.136
65 bis unter 70	1.096.150	1.701.097	1.485.112	1.942.496
70 bis unter 75	36.424	78.847	23.186	34.069
75 bis unter 80	13.323	40.926	8.588	15.408
80 und älter	7.523	19.190	3.230	7.393
Zusammen	260.949.913	261.219.291	277.486.885	279.003.803

Datenquelle: KG8

2. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die Zahl der Fälle von Arbeitsunfähigkeiten in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 vor (bitte gesondert für Bundesländer, Branchen, Betriebsgrößen, Alter und Geschlecht ausweisen)?

Die Arbeitsunfähigkeitsfälle nach Alter und Geschlecht für die Jahre 2008, 2013, 2014, 2015 und 2016 sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Für die Jahre davor ist eine entsprechende Angabe nicht möglich. Die Ergebnisse für die Jahre 2017 und 2018 liegen noch nicht vor. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

Arbeitsunfähigkeitsfälle der GKV-Mitglieder

Alter von	2008	
	Frauen	Männer
bis unter 15	128	53
15 bis unter 20	587.561	722.118
20 bis unter 25	1.576.532	1.635.191
25 bis unter 30	1.314.642	1.318.658
30 bis unter 35	1.151.174	1.242.658
35 bis unter 40	1.347.910	1.487.251
40 bis unter 45	1.760.984	1.777.701
45 bis unter 50	1.869.533	1.834.630
50 bis unter 55	1.709.503	1.685.730
55 bis unter 60	1.434.613	1.522.232
60 bis unter 65	462.151	710.203
65 bis unter 70	17.435	43.515
70 bis unter 75	2.317	5.702
75 bis unter 80	827	1.957
80 und älter	653	833
Zusammen	13.235.963	13.988.432

Alter von	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
bis unter 15	44	42	47	43
15 bis unter 20	749.775	962.378	733.872	932.596
20 bis unter 25	2.144.052	2.245.137	2.018.510	2.107.825
25 bis unter 30	2.102.805	2.036.714	2.074.010	1.990.725
30 bis unter 35	1.959.277	2.022.870	1.896.503	1.947.039
35 bis unter 40	1.760.047	1.861.255	1.718.937	1.780.001
40 bis unter 45	2.104.994	2.149.606	1.876.322	1.900.454
45 bis unter 50	2.708.207	2.599.905	2.489.721	2.371.152
50 bis unter 55	2.665.143	2.525.303	2.566.561	2.421.662
55 bis unter 60	2.126.230	2.103.748	2.083.477	2.061.865
60 bis unter 65	936.360	1.143.372	1.013.758	1.163.436
65 bis unter 70	26.079	41.565	32.062	50.533
70 bis unter 75	2.312	5.924	2.189	5.788
75 bis unter 80	883	2.629	827	2.796
80 und älter	707	1.234	710	1.327
Zusammen	19.286.915	19.701.682	18.507.506	18.737.242

Alter von	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
bis unter 15	40	59	3.174	54
15 bis unter 20	794.380	1.011.969	775.659	994.906
20 bis unter 25	2.084.812	2.199.151	2.046.247	2.170.447
25 bis unter 30	2.329.187	2.244.847	2.408.482	2.335.160
30 bis unter 35	2.107.316	2.182.219	2.200.652	2.288.711
35 bis unter 40	1.989.930	2.060.597	2.114.668	2.190.823
40 bis unter 45	2.038.977	2.057.716	2.028.718	2.039.640
45 bis unter 50	2.751.373	2.615.168	2.712.422	2.562.780
50 bis unter 55	2.979.615	2.804.809	3.089.872	2.886.766
55 bis unter 60	2.472.269	2.433.127	2.645.110	2.587.149
60 bis unter 65	1.267.589	1.349.723	1.467.347	1.506.673
65 bis unter 70	42.240	60.816	56.339	65.751
70 bis unter 75	2.430	5.957	1.490	2.102
75 bis unter 80	1.025	3.277	533	908
80 und älter	607	1.611	370	630
Zusammen	20.861.791	21.031.056	21.551.083	21.632.500

Datenquelle: KG8

3. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung hinsichtlich der Dauer der Arbeitsunfähigkeit in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 vor (bitte gesondert für Bundesländer, Branchen, Betriebsgrößen, Alter und Geschlecht ausweisen)?

Die durchschnittliche Dauer der Arbeitsunfähigkeitsfälle nach Alter und Geschlecht für die Jahre 2008, 2013, 2014, 2015 und 2016 sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Für die Jahre davor ist eine entsprechende Angabe nicht möglich. Die Ergebnisse für die Jahre 2017 und 2018 liegen noch nicht vor. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

Dauer der Arbeitsunfähigkeitsfälle der GKV-Mitglieder (in Tagen)

Alter von	2008	
	Frauen	Männer
bis unter 15	14	28
15 bis unter 20	5	5
20 bis unter 25	6	7
25 bis unter 30	8	8
30 bis unter 35	10	9
35 bis unter 40	11	11
40 bis unter 45	13	12
45 bis unter 50	14	14
50 bis unter 55	16	15
55 bis unter 60	19	18
60 bis unter 65	22	22
65 bis unter 70	24	26
70 bis unter 75	15	14
75 bis unter 80	16	14
80 und älter	15	16
Zusammen	12	12

Alter von	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
bis unter 15	9	10	9	11
15 bis unter 20	5	5	5	5
20 bis unter 25	6	6	6	6
25 bis unter 30	8	8	8	8
30 bis unter 35	9	9	9	9
35 bis unter 40	10	9	10	10
40 bis unter 45	11	11	12	11
45 bis unter 50	13	12	13	12
50 bis unter 55	15	14	14	14
55 bis unter 60	16	16	16	16
60 bis unter 65	20	21	21	22
65 bis unter 70	26	26	27	27
70 bis unter 75	15	12	14	13
75 bis unter 80	15	13	15	12
80 und älter	12	12	13	13
Zusammen	11	11	12	11

Alter von	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
bis unter 15	7	10	12	355
15 bis unter 20	5	5	5	5
20 bis unter 25	7	7	7	7
25 bis unter 30	8	8	9	9
30 bis unter 35	10	9	10	10
35 bis unter 40	11	10	11	11
40 bis unter 45	12	12	13	12
45 bis unter 50	14	14	14	14
50 bis unter 55	16	15	16	16
55 bis unter 60	17	18	18	19
60 bis unter 65	22	23	22	24
65 bis unter 70	26	28	26	30
70 bis unter 75	15	13	16	16
75 bis unter 80	13	12	16	17
80 und älter	12	12	9	12
Zusammen	13	12	13	13

Datenquelle: KG8

4. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung hinsichtlich des Krankenstandes in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 vor (bitte gesondert für Bundesländer, Branchen, Betriebsgrößen, Alter und Geschlecht ausweisen)?

Die jahresdurchschnittlichen Krankenstände nach Geschlecht für die Jahre 1997, 2007, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und für Juli 2018 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Der Krankenstand wird nicht nach dem Alter erfasst. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

Krankenstand der arbeitsunfähigen, krankengeldberechtigten Mitglieder

Jahr	Frauen	Männer
	Anteil der arbeitsunfähigen Mitglieder an den krankengeldberechtigten Mitgliedern	
1997	4,23	4,12
2007	3,33	3,08
2013	3,94	3,63
2014	3,81	3,55
2015	4,04	3,70
2016	4,44	4,08
2017	4,42	3,99
Juli 18	3,81	3,41

Datenquelle: KM1/ 13, KM1

5. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der Beschäftigten, die sich aufgrund von Krankheit arbeitsunfähig gemeldet haben (Betroffenenquote) in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 (bitte gesondert für Bundesländer, Branchen und Geschlecht ausweisen)?

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen nach der amtlichen Statistik sind die Fälle der pflicht- und der freiwillig versicherten Mitglieder erfasst. Bei den Fällen der Pflichtmitglieder können auch Fälle von Arbeitslosen enthalten sein. Bei den Fällen der freiwilligen Mitglieder können auch Selbstständige enthalten sein. Ein Anteil der Beschäftigten an den Arbeitsunfähigkeitsfällen kann nicht errechnet werden.

6. Auf welche Diagnosen lassen sich die Arbeitsunfähigkeitstage nach Erkenntnissen der Bundesregierung in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 anteilig zurückführen (bitte in absoluten Zahlen und prozentual bezogen auf alle Arbeitsunfähigkeitstage ausweisen, bitte nach Geschlecht und Alter differenzieren)?

Die Diagnosen der Arbeitsunfähigkeitstage nach Alter und Geschlecht für die Jahre 2008, 2013, 2014, 2015 und 2016 sind in der Anlage 1* aufgeführt. Für die Jahre davor ist eine entsprechende Angabe nicht möglich.

Die Ergebnisse für die Jahre 2017 und 2018 liegen noch nicht vor. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

* Von einer Drucklegung der Anlage wurde abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/4332 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

7. Wie viele Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Pflichtmitglieder gibt es aktuell nach Kenntnis der Bundesregierung; und wie stellt sich dieser Wert für die Jahre 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 dar (bitte auch nach Geschlecht, Alter, Branchen und Bundesländern differenzieren; bitte auch die Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Pflichtmitglieder differenziert nach Diagnosegruppen in absoluten Zahlen und jeweils als Anteil an allen Diagnosen ausweisen)?

Die Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Pflichtmitglieder nach Alter und Geschlecht für die Jahre 2008, 2013, 2014, 2015 und 2016 sind in der Anlage 2* aufgeführt. Der Anteil an den Diagnosen insgesamt entspricht dem in der Antwort zu Frage 6 dargestellten Anteil bezogen auf alle Arbeitsunfähigkeitstage. Für die Jahre davor ist eine entsprechende Angabe nicht möglich.

Die Ergebnisse für die Jahre 2017 und 2018 liegen noch nicht vor. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

8. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung vor über die Beschäftigten in Krankenhäusern hinsichtlich ihrer erkrankungsbedingten Fehlzeiten sowie des Krankenstandes und in stationären Pflegeeinrichtungen in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 (bitte jeweils gesondert und nach Bundesländern sowie Betriebsgrößen geordnet ausweisen)?

Die Arbeitsunfähigkeitstage von Mitgliedern werden in der amtlichen Statistik nicht nach ihrer Arbeitsstätte separat erfasst.

Die Verbände der Krankenkassen erfassen Arbeitsunfähigkeitstage differenzierter. So werden beispielsweise im Fehlzeiten-Report 2017 der AOK Arbeitsunfähigkeitstage auf Basis der AOK-Daten für verschiedene Branchen und Krankheitsarten ausgewiesen. Für die Diagnosegruppe psychische und Verhaltensstörungen entfallen dort für das Jahr 2016 die meisten Arbeitsunfähigkeitstage auf folgende Berufsgruppen: Aufsichtskräfte im Hochbau (32,6 Tage), Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege (29,7 Tage) und Berufe in der Altenpflege (29,4 Tage). Im Vergleich dazu werden im Fehlzeiten-Report 2017 für Berufe in der Altenpflege je AOK-Mitglied im Jahr 2016 über alle Diagnosegruppen hinweg durchschnittlich 27,2 Arbeitsunfähigkeitstage ausgewiesen. Eine differenzierte Erhebung für Krankenhäuser wurde von der AOK nicht vorgenommen.

Auch wenn diese Erkenntnisse nicht repräsentativ für die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung sind, waren diese Zahlen Anlass für die Bundesregierung mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals u. a. auf Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zu zielen, insbesondere auch mit Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Auch die Konzertierte Aktion Pflege wird der Frage weiter nachgehen, wie sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege weiter verbessern lassen. In einer Arbeitsgruppe werden dabei auch die Themen betriebliche Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz in den Blick genommen.

* Von einer Drucklegung der Anlage wurde abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/4332 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

9. Welche Erkenntnis liegen der Bundesregierung vor hinsichtlich der Arbeitsunfähigkeitstage und des Krankenstandes von Beschäftigten in Bundesministerien inklusive nachgeordneter Behörden und Institute in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 vor (bitte jeweils gesondert für Bundesministerien, Behörden und Institute ausweisen; bitte nach Alter und Geschlecht differenzieren)?

Die vorliegenden Daten beziehen sich, soweit die Daten vorliegen, auf die Jahre 1997 und 2007 sowie 2013 bis 2016. Der Gesundheitsförderungsbericht 2017 wird im Spätherbst 2018 veröffentlicht werden, die Daten für 2018 liegen noch nicht vor. Im Jahr 1997 wurde das Geschlecht der Beschäftigten in der Abfrage nicht erhoben. Die Erhebung der Altersgruppen erfolgte erstmals vollständig ab der Erhebung 2008, daher liegen der Bundesregierung für die davor liegenden Jahre keine entsprechenden Daten vor.

Tabelle 1: Übersicht über die durchschnittlichen krankheitsbedingten Fehlzeiten pro Beschäftigten in obersten Bundesbehörden und deren Geschäftsbereich in Tagen sowie in Prozent:

Jahr	Krankheitsbedingte Fehltag pro Beschäftigten	AU-Prozent
1997	14,92	5,94 %
2007	15,73	6,27 %
2013	19,75	7,87 %
2014	19,25	7,67 %
2015	20,25	8,07 %
2016	21,01	8,53 %

Tabelle 2: Krankheitsbedingte Fehlzeiten differenziert zwischen oberster Bundesbehörde und Geschäftsbereich in Tagen:

Jahr	oberste Bundesbehörde	Geschäftsbereich
1997	11,56	15,18
2007	14,60	15,83
2013	15,94	20,12
2014	15,23	19,65
2015	16,24	20,67
2016	16,20	21,53

Abwesenheitstage je oberster Bundesbehörde und Geschäftsbereich für die Jahre 2013 bis 2016

Tabelle 3: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2013 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2014)

Ranking	oberste Bundesbehörde	Abwesenheitstage 2012	Abwesenheitstage 2013	Differenz zum Vorjahr
1	BVerfG	13,44	10,86	- 2,58
2	BMJ	13,01	12,02	- 0,99
3	BKM	11,12	12,14	+1,02
4	BMZ	13,07	12,89	- 0,18
5	BPrA	13,44	13,36	- 0,08
6	BMG	13,41	13,69	+0,28
7	BMELV	12,82	13,90	+1,08
8	AA	14,85	14,14	- 0,71
9	BMF	15,89	14,73	- 1,16
10	BMVBS	15,35	14,94	- 0,41
11	BMU	13,38	14,96	+1,58
12	BK	14,16	15,00	+0,84
13	BMAS	19,01	15,59	- 3,42
14	BMFSFJ	15,18	15,92	+0,74
	OB* gesamt	15,74	15,94	+0,20
15	BMWi	13,89	16,75	+2,86
16	BRH	14,23	17,57	+3,34
17	BT	17,71	17,87	+0,16
18	BMI	16,44	18,11	+1,67
19	BPA	17,24	18,57	+1,33
20	BMVg	20,55	19,44	- 1,11
21	BMBF	17,25	19,85	+2,60
22	BR	19,10	21,94	+2,84

*OB = Mittelwert der Abwesenheiten in den obersten Bundesbehörden

Tabelle 4: Abwesenheitstage je Geschäftsbereich (ohne oberste Bundesbehörde) im Jahr 2013 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2013)

Ranking	oberste Bundesbehörde	Abwesenheitstage 2012	Abwesenheitstage 2013	Differenz zum Vorjahr
1	AA	8,24	4,97	- 3,27
2	BMELV	12,90	12,94	+0,04
3	BMAS	14,24	13,67	- 0,57
4	BMWi	13,83	13,84	+0,01
5	BMJ	13,78	15,67	+1,89
6	BMG	16,98	15,85	- 1,13
7	BMU	13,80	16,68	+2,88
8	BMVBS	16,78	17,74	+0,96
9	BMFSFJ	16,73	18,78	+2,05
	GB* gesamt	19,62	20,12	+0,50
10	BMVg	18,75	20,43	+1,68
11	BMI	21,48	21,12	- 0,36
12	BMF	23,06	22,80	- 0,26
13	BKM	24,07	23,39	- 0,68
14	BRH	21,46	24,11	+2,65

* GB = Mittelwert der Abwesenheiten in den Geschäftsbereichen; Ressorts ohne Geschäftsbehörden wurden nicht berücksichtigt.

Tabelle 5: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2014 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2014)

Ranking	Oberste Bundesbehörde	Abwesenheitstage 2013	Abwesenheitstage 2014	Differenz zum Vorjahr
1	BVerfG	10,86	10,45	-0,41
2	BPrA	13,36	11,44	-1,92
3	BKM	12,14	11,56	-0,58
4	BK	15,00	11,67	-3,33
5	BMJV	12,02	12,31	0,29
6	BMG	13,69	12,37	-1,32
7	BMEL	13,90	12,79	-1,11
8	BMUB	14,96	13,19	-1,77
9	AA	14,14	13,23	-0,91
10	BMVI	14,94	13,76	-1,18
11	BMFSFJ	15,92	14,39	-1,53
12	BMAS	15,59	14,69	-0,90
13	BMZ	12,89	14,75	1,86
14	BMF	14,73	14,76	0,03
15	BPA	18,57	14,87	-3,70
16	BMWi	16,75	15,17	-1,58
	OB* insgesamt	15,94	15,23	-0,71
17	BRH	17,57	16,96	-0,61
18	BMBF	19,85	17,49	-2,36
19	BMI	18,11	17,73	-0,38
20	BT	17,87	18,75	0,88
21	BR	21,94	19,44	-2,50
22	BMVg	19,44	20,06	0,62

* OB = Mittelwert der Abwesenheiten in den obersten Bundesbehörden

Tabelle 6: Abwesenheitstage je Geschäftsbereich (ohne oberste Bundesbehörde) im Jahr 2014 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2014)

Ranking	Oberste Bundesbehörde Geschäftsbereich	Abwesenheitstage 2013	Abwesenheitstage 2014	Differenz zum Vorjahr
1	AA	4,97	6,12	1,15
2	BMEL	12,94	12,72	-0,22
3	BMWi	13,84	13,84	0,00
4	BMAS	13,67	14,37	0,70
5	BMVI	17,74	14,92	-2,82
6	BMJV	15,67	15,52	-0,15
7	BMG	15,85	16,18	0,33
8	BMUB	16,68	16,34	-0,34
9	BMFSFJ	18,78	19,34	0,56
	GB* gesamt	20,12	19,65	-0,47
10	BMVg	20,43	20,21	-0,22
11	BMI	21,12	21,00	-0,12
12	BMF	22,80	21,88	-0,92
13	BRH	24,11	21,91	-2,20
14	BKM	23,39	25,65	2,26

* GB = Mittelwert der Abwesenheiten in den Geschäftsbereichen; Ressorts ohne Geschäftsbehörden wurden nicht berücksichtigt.

Tabelle 7: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2015 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2015)

Ranking	Oberste Bundesbehörde	Abwesenheitstage 2014	Abwesenheitstage 2015	Differenz zum Vorjahr
1	BMEL	12,79	13,45	0,66
2	BMG	12,37	13,58	1,21
3	AA	13,23	13,77	0,54
4	BMZ	14,75	13,82	-0,93
5	BPrA	11,44	13,83	2,39
6	BVerfG	10,45	13,98	3,53
7	BMJV	12,31	14,11	1,80
8	BK	11,67	14,34	2,67
9	BMVI	13,76	14,71	0,95
10	BKM	11,56	14,73	3,18
11	BMUB	13,19	15,42	2,23
12	BMAS	14,69	15,54	0,84
13	BMF	14,76	15,71	0,95
14	BMFSFJ	14,39	15,79	1,40
	OB* insgesamt	15,23	16,24	1,01
15	BMWi	15,17	16,28	1,11
16	BMBF	17,49	17,05	-0,44
17	BPA	14,87	17,56	2,68
18	BMI	17,73	18,16	0,42
19	BRH	16,96	18,34	1,38
20	BMVg	20,06	19,25	-0,81
21	BR	19,44	19,92	0,48
22	BT	18,75	21,15	2,40

* OB = Mittelwert der Abwesenheiten in den obersten Bundesbehörden

Tabelle 8: Abwesenheitstage je Geschäftsbereich (ohne oberste Bundesbehörde) im Jahr 2015 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2015)

Ranking	Oberste Bundesbehörde Geschäftsbereich	Abwesenheitstage 2014	Abwesenheitstage 2015	Differenz zum Vorjahr
1	AA	6,12	7,40	1,28
2	BMEL	12,72	13,72	1,00
3	BMWi	13,84	14,97	1,13
4	BMAS	14,37	15,73	1,37
5	BMUB	16,34	16,07	-0,27
6	BMJV	15,52	16,43	0,91
7	BMG	16,18	16,96	0,78
8	BMVI	14,92	18,71	3,80
9	BMF	21,88	18,81	-3,07
10	BMFSFJ	19,34	19,34	0,00
	GB* gesamt	19,65	20,67	1,02
11	BRH	21,91	21,91	0,00
12	BMVg	20,21	21,99	1,78
13	BMI	21,00	23,37	2,37
14	BKM	25,65	25,77	0,12

* GB = Mittelwert der Abwesenheiten in den Geschäftsbereichen; Ressorts ohne Geschäftsbe-
reichsbehörden wurden nicht berücksichtigt.

Tabelle 9: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2016 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2016)

Ranking	Oberste Bundesbehörde	Abwesenheitstage 2016	Abwesenheitstage 2015	Differenz zum Vorjahr
1	BMUB	11,83	15,42	-3,59
2	BfDI (OB seit 01.01.2016)	12,87		
3	BKM	13,06	14,73	-1,67
4	AA	13,16	13,77	-0,61
5	BVerfG	13,59	13,98	-0,39
6	BMG	14,07	13,58	0,49
7	BMEL	14,11	13,45	0,66
8	BMJV	14,18	14,11	0,06
9	BK	14,42	14,34	0,07
10	BMFSFJ	14,55	15,79	-1,24
11	BMZ	14,57	13,82	0,75
12	BPA	15,60	17,56	-1,95
13	BMBF	16,15	17,05	-0,89
	OB* insgesamt	16,20	16,24	-0,04
14	BMVI	16,39	14,71	1,68
15	BMAS	16,47	15,54	0,93
16	BMF**	16,57	15,71	0,86
17	BMWi	16,92	16,28	0,65
18	BMI	17,48	18,16	-0,68
19	BRH	18,05	18,34	-0,29
20	BPrA	18,24	13,83	4,41
21	BR	19,12	19,92	-0,80
22	BMVg	19,42	19,25	0,18
23	BT	22,11	21,15	0,97

* OB = Mittelwert der Abwesenheiten in den obersten Bundesbehörden

** Die Abweichung der AU-Tage im Jahr 2015 zu den AU-Tagen 2014 und 2016 wird auf eine IT-Umstellung in der Bundesfinanzverwaltung zurückgeführt.

Tabelle 10: Abwesenheitstage je Geschäftsbereich (ohne oberste Bundesbehörde) im Jahr 2016 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2016)

Ranking	Oberste Bundesbehörde Geschäftsbereich	Abwesenheitstage 2016	Abwesenheitstage 2015	Differenz zum Vorjahr
1	AA	8,15	7,40	0,74
2	BMEL	14,09	13,72	0,37
3	BMWi	15,02	14,97	0,05
4	BMAS	15,64	15,73	-0,09
5	BMJV	15,82	16,43	-0,61
6	BMUB	16,09	16,07	0,02
7	BMG	17,84	16,96	0,88
8	BMVI	19,15	18,71	0,44
9	BMFSFJ	19,18	19,34	-0,16
	GB* gesamt	21,53	20,67	0,86
10	BMVg	22,35	21,99	0,36
11	BMI	22,68	23,37	-0,70
12	BRH	22,83	21,91	0,91
13	BMF**	23,21	18,81	4,40
14	BKM	26,58	25,77	0,81

* GB = Mittelwert der Abwesenheiten in den Geschäftsbereichen; Ressorts ohne Geschäftsbereichsbehörden wurden nicht berücksichtigt.

** Die Abweichung der AU-Tage im Jahr 2015 zu den AU-Tagen 2014 und 2016 wird auf eine IT-Umstellung in der Bundesfinanzverwaltung zurückgeführt.“

Tabelle 11: Abwesenheitsbedingte Fehlzeiten nach Geschlecht

Jahr	Frauen	Männer
2007	17,15	14,95
2013	21,07	18,98
2014	20,83	18,29
2015	21,27	19,62
2016	22,50	20,11

Für das Jahr 1997 liegen der Bundesregierung keine Daten vor.

Tabelle 12: Durchschnittliche Abwesenheit je Beschäftigtem nach Altersgruppen in der unmittelbaren Verwaltung in den Jahren 2013-2016.

Jahr 2013	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	12,02	9,60	10,58
25-29	12,93	10,14	11,40
30-34	15,91	11,52	13,45
35-39	19,06	15,51	16,94
40-44	19,88	17,89	18,64
45-49	21,05	18,90	19,71
50-54	24,43	21,05	22,22
55-59	28,33	24,48	25,67
≥ 60	28,89	25,19	26,21
Insg.	21,07	18,98	19,75

Jahr 2014	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	11,78	9,96	10,67
25-29	13,24	10,21	11,56
30-34	14,97	10,77	12,62
35-39	18,49	14,23	15,98
40-44	19,82	16,96	18,06
45-49	20,80	18,02	19,09
50-54	23,88	19,89	21,31
55-59	27,88	23,95	25,20
≥ 60	28,46	25,26	26,20
Insg.	20,83	18,29	19,25

Jahr 2015	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	11,80	9,99	10,68
25-29	13,19	11,40	12,19
30-34	14,56	11,76	12,97
35-39	18,49	14,81	16,25
40-44	19,54	18,25	18,75
45-49	20,80	19,46	20,09
50-54	23,89	21,49	22,37
55-59	28,94	25,25	26,45
≥ 60	31,14	27,49	28,58
Insg.	21,27	19,62	20,25

Jahr 2016	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	11,65	10,25	10,78
25-29	14,63	11,66	12,94
30-34	15,29	12,01	13,42
35-39	19,72	14,97	16,97
40-44	21,23	18,26	19,44
45-49	23,22	20,33	21,46
50-54	25,83	22,26	23,58
55-59	29,70	26,47	27,53
≥ 60	32,73	28,83	30,03
Insg.	22,50	20,11	21,01

10. In wie vielen der Fälle, für die gesetzlich ein solches vorgeschrieben ist, wurde nach Erkenntnissen der Bundesregierung tatsächlich ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 durchgeführt (bitte jeweils gesondert und nach Bundesländern sowie Branchen ausweisen)?

Dazu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

11. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung vor bezüglich des Anteils der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die auf Arbeitsunfälle zurückzuführen sind, in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 (bitte prozentual und in Summe sowie gesondert nach Bundesländern sowie Branchen ausweisen, bitte nach Alter und Geschlecht differenzieren)?

Die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) beziehen sich immer auf meldepflichtige Unfälle gemäß § 193 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) (Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder Tod des Versicherten). Ein meldepflichtiger Unfall kann demnach auch mehrere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zur Folge haben, die nicht separat gezählt werden können. Über die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, welche auf Arbeitsunfälle zurückzuführen sind und zu insgesamt weniger als vier Tagen Dauer der Arbeitsunfähigkeit führten, liegen ebenfalls keine Angaben vor. Der Anteil der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die auf Arbeitsunfälle zurückzuführen sind, kann nicht errechnet werden.

		Meldepflichtige Unfälle ¹⁾						
		1997	2007	2013	2014	2015	2016	2017
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Arbeitsunfälle	männlich	1.157.578	737.826	637.174	634.566	626.283	636.154	631.916
	weiblich	294.704	221.464	237.340	235.251	238.970	240.093	240.949
	Gesamt ²⁾	1.453.100	959.714	874.514	869.817	866.056	877.071	873.522
Wegeunfälle	männlich	118.226	86.065	88.751	84.189	86.250	91.260	92.855
	weiblich	117.699	80.903	96.916	90.051	92.809	94.663	97.963
	Gesamt ²⁾	235.983	167.067	185.667	174.240	179.181	186.070	190.968
Gesamt	männlich	1.275.804	823.890	725.925	718.755	712.533	727.414	724.771
	weiblich	412.403	302.367	334.256	325.302	331.780	334.756	338.912
	Gesamt ²⁾	1.689.083	1.126.781	1.060.181	1.044.057	1.045.237	1.063.141	1.064.490

¹⁾ Da es sich hierbei um eine hochgerechnete Stichprobenstatistik handelt, können Hochrechnungsunsicherheiten und Rundungsfehler auftreten.

²⁾ einschließlich keine Angabe

Quelle: Referat - Statistik - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

12. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung vor bezüglich der Anzahl der Fälle, in denen Beschäftigten Krankengeld ausgezahlt wurde in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 (bitte prozentual im Verhältnis zur Gesamtzahl der Beschäftigten und in Summe sowie gesondert nach Bundesländern sowie Branchen ausweisen)?

Bei den Krankengeldfällen nach der amtlichen Statistik sind die Fälle der Pflicht- und freiwillig versicherten Mitglieder erfasst. Bei den Fällen der Pflichtmitglieder können auch Fälle von Arbeitslosen enthalten sein. Bei den Fällen der freiwilligen Mitglieder können auch Selbstständige enthalten sein. Ein Anteil der Beschäftigten an den Arbeitsunfähigkeitsfällen kann nicht errechnet werden.

13. Welche Berufsgruppen weisen nach Kenntnis der Bundesregierung besonders erhöhte Werte bei den Arbeitsunfähigkeitstagen je 100 Pflichtmitglieder auf, und wie hoch sind die Werte jeweils?

Die Arbeitsunfähigkeitstage von Mitgliedern werden nicht nach ihrer Arbeitsstätte separat erfasst, daher können keine Berufsgruppen mit besonders hohen Werten genannt werden.

14. Auf welche Diagnosen sind die Krankengeldfälle nach Kenntnis der Bundesregierung zurückzuführen (bitte sowohl relative als auch absolute Werte ausweisen, bitte jeweils gesondert und nach Bundesländern sowie Branchen ausweisen und nach Alter und Geschlecht differenzieren)?

Bei den der Antwort zu Frage 6 zugrunde liegenden Arbeitsunfähigkeitsfällen sind sowohl Arbeitsunfähigkeitsfälle in der Lohnfortzahlung als auch die im Krankengeldbezug zusammen erfasst. Welche Diagnosen zu Krankengeldbezug führen, kann nicht errechnet werden.

15. In wie vielen Fällen sind nach Erkenntnissen der Bundesregierung Beschäftigte krank zur Arbeit gegangen (Präsentismus) in den Jahren 1997, 2007 sowie in den Jahren von 2013 bis 2018 (bitte absolut und prozentual sowie jeweils gesondert nach Bundesländern und Branchen ausweisen)?

Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst.

16. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die gesamtgesellschaftlichen Kosten, die durch Arbeitsunfähigkeitstage entstehen, aktuell, und wie haben sich diese Kosten seit dem Jahr 1997 entwickelt (sofern möglich bitte jährlich angeben)?

In den jährlichen Berichten zum Stand von „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ (SuGA) – früher „Unfallverhütungsbericht“ – werden die volkswirtschaftlichen Kosten im Sinne des Produktionsausfalls durch Arbeitsunfähigkeit geschätzt. Zu darüber hinausgehenden gesamtgesellschaftlichen Kosten liegen keine Informationen vor. Die Schätzungen basieren auf Daten der gesetzlichen Krankenkassen und werden auf alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hochgerechnet. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es über die hier dargestellte Zeitreihe hinweg nicht durchgängig die gleichen Krankenkassen sind, die Daten zur Schätzung beisteuern (Details hierzu sind zu finden in den Berichten der jeweiligen Jahre unter www.baua.de/suga). Neben diesem Aspekt, der die Interpretation der Daten als Zeitreihe einschränkt, müssen zwei weitere Aspekte bei der Deutung berücksichtigt werden: Zum einen gibt es viele Einflussfaktoren auf das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen, die hier unberücksichtigt bleiben (z. B. zeitliche begrenzte Erkrankungswellen – wie Grippewellen durch Wetter bedingte höhere Anzahl an Erkältungen oder auch Unfällen, konjunkturelle Entwicklungen mit tendenziell weniger Krankmeldungen bei wirtschaftlich angespannter Lage). Zum anderen ist die Preissteigerung, die über den Zeitraum von fast 20 Jahren bei ca. 30 Prozent liegt und auch die hier einfließenden Gehälter betrifft, nicht bereinigt. Die Gesamtsumme des Produktionsausfalls wird daher auch im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen dargestellt. Zudem hat sich auch die Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verändert, so dass auch diese jeweils in die Tabelle mit aufgenommen werden.

Jahr	Anzahl Arbeitnehmer/ innen in Millionen	Ausfalltage in Millionen	Produktionsausfall in € (bis zum Jahr 2000 in DM)	Anteil am Bruttonational- einkommen in Prozent
1997	30,4	517,1	46 (89)	nicht berechnet
1998	32,0	470,4	41 (81)	2,1 %
1999	34,0	476,0	41 (79)	2,1 %
2000	34,7	430,5	37 (72)	1,8 %
2001	34,8	508,6	45	2,2 %
2002	34,6	491,1	44	2,1 %
2003	34,1	467,8	43	2,0 %
2004	34,7	440,1	40	1,8 %
2005	34,5	420,5	38	1,7 %
2006	34,7	401,4	36	1,6 %
2007	35,3	437,7	40	1,6 %
2008	35,8	456,8	43	1,7 %
2009	35,8	459,2	43	1,8 %
2010	36,1	408,9	39	1,6 %
2011	36,6	460,6	46	1,8 %
2012	37,1	521,6	53	1,9 %
2013	37,8	567,7	59	2,0 %
2014	37,7	543,4	57	2,0 %
2015	38,7	587,4	64	2,1 %
2016	39,3	674,5	75	2,4 %

Im betrachteten Zeitraum ist die Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeit (+ 30 Prozent) ähnlich stark gestiegen wie die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (+ 29 Prozent). Die Produktionsausfallkosten liegen dennoch mit einem Anstieg von 63 Prozent über der allgemeinen Preissteigerung von ca. 30 Prozent. Betrachtet man den in der Tabelle ebenfalls ausgewiesenen Anteil dieser am Bruttonationaleinkommen, wird deutlich, dass – nach einem Rückgang von 2001 bis 2006/2007 – hier in den letzten Jahren deutliche Anstiege sichtbar sind, die 2016 zum höchsten Anteil hier dargestellten Jahre führte.

17. Welche arbeitsbedingten Ursachen für Arbeitsunfähigkeiten gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung, und welche dieser Ursachen sind hinsichtlich der Zahl und der Dauer der Arbeitsunfähigkeiten von besonderer Relevanz?

Im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) wurde Anfang des Jahrtausends ein Forschungsprojekt durchgeführt, das die Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen abgeschätzt hat. Die dabei – u. a. anhand der 1998 durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) und das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) veröffentlichten Befragungsergebnisse – ermittelten bedeutendsten Belastungsfaktoren waren Arbeitsschwere/Lastenheben und geringer Handlungsspielraum (Bödeker, W.; Friedel, H.; Röttger, Chr.; Schröer, A. (2002): Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen in Deutschland. 1. Auflage. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW Verlag für neue Wissenschaft GmbH, Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Forschungsbericht, Fb 946).

Die Auftragnehmer des Forschungsprojektes haben in der Folge im Jahr 2011 (Bödeker, W.; Barthelmes, I. (2011): Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und Berufe mit hoher Krankheitslast in Deutschland. Hrsg.: Initiative Gesundheit und Arbeit: iga-report 22) im iga report 22 physische, psychische und organisationale Risikofaktoren basierend auf der Literatur ermittelt und unter Nutzung der BIBB/BAuA-Befragung 2006 (dem Nachfolger der BIBB-IAB-Befragung 1998) näher analysiert. Im Ergebnis wiesen Berufsgruppen mit hoher Krankheitslast folgende Einzelbelastungen besonders häufig auf:

- Schichtarbeit
- Lasten heben
- Rauch, Staub, Gase, Dämpfe
- Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit, Zugluft
- Öl, Fett, Schmutz, Dreck
- Zwangshaltungen
- Vibrationen
- schlechte Beleuchtung
- Gefahrstoffe oder Strahlung
- Schutzkleidung
- unter Lärm arbeiten
- Mikroorganismen
- Tabakrauch
- Einzelheiten werden vorgeschrieben

- Stückzahl oder anderes werden vorgegeben
- Arbeit nicht selbst planen und einteilen können
- keinen Einfluss auf Pausen haben
- Tätigkeit ist nicht wichtig
- nicht Teil einer Gemeinschaft sein
- Zusammenarbeit mit Kollegen ist nicht gut
- kaum Unterstützung durch Kollegen.

Anlage 1

Die Diagnosen der Arbeitsunfähigkeitstage nach Alter und Geschlecht:

Absolut Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten		
bis unter 15	58	7
15 bis unter 20	271.466	320.410
20 bis unter 25	763.730	792.911
25 bis unter 30	633.962	685.034
30 bis unter 35	546.578	661.781
35 bis unter 40	659.766	800.915
40 bis unter 45	852.277	913.839
45 bis unter 50	897.059	918.596
50 bis unter 55	860.498	825.091
55 bis unter 60	740.062	749.714
60 bis unter 65	256.023	368.137
65 bis unter 70	8.833	26.296
70 bis unter 75	908	1.390
75 bis unter 80	262	502
80 und älter	191	172
Zusammen	6.491.673	7.064.795
II. Neubildungen		
bis unter 15	3	7
15 bis unter 20	14.684	21.254
20 bis unter 25	93.363	103.606
25 bis unter 30	156.599	134.065
30 bis unter 35	256.011	177.687
35 bis unter 40	605.621	257.777
40 bis unter 45	1.327.431	456.357
45 bis unter 50	2.090.080	724.420
50 bis unter 55	2.195.152	1.118.572
55 bis unter 60	2.083.210	1.591.815
60 bis unter 65	990.157	1.134.343
65 bis unter 70	51.810	108.860
70 bis unter 75	3.428	9.759
75 bis unter 80	1.017	3.121
80 und älter	575	1.210
Zusammen	9.869.141	5.842.853

Absolut Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems		
bis unter 15	0	0
15 bis unter 20	4.356	2.585
20 bis unter 25	14.817	12.761
25 bis unter 30	19.894	13.744
30 bis unter 35	28.640	20.237
35 bis unter 40	42.909	23.619
40 bis unter 45	61.968	33.439
45 bis unter 50	77.126	41.446
50 bis unter 55	70.267	46.257
55 bis unter 60	55.172	60.748
60 bis unter 65	20.654	44.858
65 bis unter 70	682	5.253
70 bis unter 75	58	486
75 bis unter 80	201	288
80 und älter	174	157
Zusammen	396.918	305.878

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

bis unter 15	0	19
15 bis unter 20	8.463	8.587
20 bis unter 25	43.109	30.367
25 bis unter 30	67.015	38.317
30 bis unter 35	90.071	52.331
35 bis unter 40	141.412	85.319
40 bis unter 45	229.447	160.871
45 bis unter 50	290.969	237.693
50 bis unter 55	297.257	297.795
55 bis unter 60	300.444	369.977
60 bis unter 65	113.884	211.915
65 bis unter 70	6.292	16.386
70 bis unter 75	955	1.728
75 bis unter 80	751	850
80 und älter	415	486
Zusammen	1.590.484	1.512.641

Absolut Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
V. Psychische und Verhaltensstörungen		
bis unter 15	169	160
15 bis unter 20	191.219	121.621
20 bis unter 25	1.227.073	721.548
25 bis unter 30	1.706.919	1.113.726
30 bis unter 35	1.971.014	1.251.677
35 bis unter 40	2.782.456	1.772.066
40 bis unter 45	3.968.020	2.387.600
45 bis unter 50	4.462.944	2.732.267
50 bis unter 55	4.385.098	2.807.821
55 bis unter 60	4.110.974	2.732.227
60 bis unter 65	1.422.767	1.398.683
65 bis unter 70	48.784	83.837
70 bis unter 75	1.082	2.175
75 bis unter 80	283	864
80 und älter	570	501
Zusammen	26.279.372	17.126.773

VI. Krankheiten des Nervensystems		
bis unter 15	3	0
15 bis unter 20	50.466	43.416
20 bis unter 25	219.996	169.621
25 bis unter 30	277.775	213.097
30 bis unter 35	314.588	246.281
35 bis unter 40	471.044	378.477
40 bis unter 45	764.004	544.881
45 bis unter 50	927.949	648.911
50 bis unter 55	903.089	706.383
55 bis unter 60	787.774	740.984
60 bis unter 65	255.971	414.580
65 bis unter 70	9.315	35.232
70 bis unter 75	745	2.211
75 bis unter 80	297	711
80 und älter	82	322
Zusammen	4.983.098	4.145.107

Absolut Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde		
bis unter 15	0	0
15 bis unter 20	13.955	17.433
20 bis unter 25	50.205	51.391
25 bis unter 30	59.596	58.660
30 bis unter 35	61.800	69.534
35 bis unter 40	81.320	96.037
40 bis unter 45	122.902	145.161
45 bis unter 50	157.735	186.197
50 bis unter 55	201.097	234.951
55 bis unter 60	225.539	283.954
60 bis unter 65	108.837	182.129
65 bis unter 70	5.175	14.529
70 bis unter 75	795	1.497
75 bis unter 80	257	406
80 und älter	120	265
Zusammen	1.089.333	1.342.144

VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes		
bis unter 15	23	1
15 bis unter 20	27.955	31.572
20 bis unter 25	99.260	86.267
25 bis unter 30	105.624	89.908
30 bis unter 35	111.548	107.692
35 bis unter 40	158.335	150.422
40 bis unter 45	232.430	208.423
45 bis unter 50	263.783	245.282
50 bis unter 55	283.052	247.461
55 bis unter 60	252.901	251.937
60 bis unter 65	80.351	125.595
65 bis unter 70	2.893	7.043
70 bis unter 75	215	380
75 bis unter 80	38	99
80 und älter	28	42
Zusammen	1.618.436	1.552.124

Absolut Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems		
bis unter 15	32	0
15 bis unter 20	44.102	41.591
20 bis unter 25	175.129	150.412
25 bis unter 30	212.558	194.818
30 bis unter 35	240.422	255.890
35 bis unter 40	398.132	470.011
40 bis unter 45	718.437	934.880
45 bis unter 50	1.076.717	1.567.388
50 bis unter 55	1.312.176	2.258.921
55 bis unter 60	1.511.056	3.014.052
60 bis unter 65	717.833	1.962.587
65 bis unter 70	36.332	169.617
70 bis unter 75	5.545	18.465
75 bis unter 80	3.101	5.289
80 und älter	1.833	2.723
Zusammen	6.453.405	11.046.644
X. Krankheiten des Atmungssystems		
bis unter 15	180	57
15 bis unter 20	857.940	986.751
20 bis unter 25	2.478.087	2.392.014
25 bis unter 30	2.372.915	2.172.495
30 bis unter 35	2.268.791	2.283.878
35 bis unter 40	2.749.185	2.833.952
40 bis unter 45	3.544.595	3.296.010
45 bis unter 50	3.698.983	3.335.869
50 bis unter 55	3.540.956	3.099.844
55 bis unter 60	3.103.485	2.895.666
60 bis unter 65	1.047.605	1.438.968
65 bis unter 70	38.041	91.049
70 bis unter 75	3.338	6.064
75 bis unter 80	729	2.300
80 und älter	370	582
Zusammen	25.705.200	24.835.499

Absolut Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XI. Krankheiten des Verdauungssystems		
bis unter 15	59	5
15 bis unter 20	398.918	418.267
20 bis unter 25	1.147.353	1.171.779
25 bis unter 30	896.969	1.017.070
30 bis unter 35	730.624	941.130
35 bis unter 40	897.034	1.186.128
40 bis unter 45	1.273.193	1.551.557
45 bis unter 50	1.457.311	1.747.668
50 bis unter 55	1.405.377	1.718.717
55 bis unter 60	1.284.930	1.680.714
60 bis unter 65	449.416	808.941
65 bis unter 70	17.957	54.412
70 bis unter 75	1.681	5.661
75 bis unter 80	688	1.943
80 und älter	696	482
Zusammen	9.962.206	12.304.474

XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut		
bis unter 15	0	0
15 bis unter 20	56.286	119.644
20 bis unter 25	181.475	342.236
25 bis unter 30	153.027	300.803
30 bis unter 35	136.647	250.880
35 bis unter 40	181.206	289.639
40 bis unter 45	273.906	381.893
45 bis unter 50	299.791	399.811
50 bis unter 55	296.202	379.157
55 bis unter 60	278.728	380.107
60 bis unter 65	92.401	173.628
65 bis unter 70	3.661	12.397
70 bis unter 75	346	941
75 bis unter 80	38	1.077
80 und älter	151	70
Zusammen	1.953.865	3.032.283

Absolut Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes		
bis unter 15	1.146	1.010
15 bis unter 20	268.632	386.273
20 bis unter 25	1.172.705	1.690.650
25 bis unter 30	1.469.229	2.197.668
30 bis unter 35	1.728.126	2.727.939
35 bis unter 40	2.935.071	4.347.308
40 bis unter 45	5.170.268	6.447.632
45 bis unter 50	6.936.999	7.891.675
50 bis unter 55	7.827.444	8.170.358
55 bis unter 60	8.212.884	9.091.595
60 bis unter 65	3.267.521	5.390.899
65 bis unter 70	122.242	353.581
70 bis unter 75	7.042	11.151
75 bis unter 80	1.571	3.908
80 und älter	1.128	1.568
Zusammen	39.122.008	48.713.215
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems		
bis unter 15	32	3
15 bis unter 20	111.721	27.117
20 bis unter 25	368.092	96.577
25 bis unter 30	381.356	108.810
30 bis unter 35	395.943	128.614
35 bis unter 40	529.403	175.477
40 bis unter 45	806.981	247.224
45 bis unter 50	940.293	329.941
50 bis unter 55	836.729	367.646
55 bis unter 60	625.485	432.482
60 bis unter 65	216.157	259.442
65 bis unter 70	8.755	21.354
70 bis unter 75	782	3.324
75 bis unter 80	350	1.164
80 und älter	203	465
Zusammen	5.222.282	2.199.640

Absolut Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett		
bis unter 15	0	0
15 bis unter 20	39.925	0
20 bis unter 25	415.075	0
25 bis unter 30	921.407	0
30 bis unter 35	944.294	0
35 bis unter 40	617.496	0
40 bis unter 45	186.677	0
45 bis unter 50	20.961	0
50 bis unter 55	5.284	0
55 bis unter 60	3.439	0
60 bis unter 65	1.543	0
65 bis unter 70	15	0
70 bis unter 75	12	0
75 bis unter 80	0	0
80 und älter	0	0
Zusammen	3.156.128	0

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15	28	145
15 bis unter 20	155	238
20 bis unter 25	1.007	290
25 bis unter 30	3.239	775
30 bis unter 35	2.906	436
35 bis unter 40	3.490	830
40 bis unter 45	2.055	833
45 bis unter 50	388	402
50 bis unter 55	773	367
55 bis unter 60	503	601
60 bis unter 65	100	607
65 bis unter 70	0	13
70 bis unter 75	0	0
75 bis unter 80	0	0
80 und älter	0	0
Zusammen	14.644	5.537

Absolut Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien		
bis unter 15	2	16
15 bis unter 20	9.608	10.760
20 bis unter 25	41.898	30.767
25 bis unter 30	41.647	29.801
30 bis unter 35	35.176	27.720
35 bis unter 40	43.361	34.989
40 bis unter 45	55.052	36.918
45 bis unter 50	61.491	43.473
50 bis unter 55	55.873	38.327
55 bis unter 60	47.654	41.552
60 bis unter 65	22.098	18.237
65 bis unter 70	342	2.747
70 bis unter 75	3	81
75 bis unter 80	0	53
80 und älter	0	8
Zusammen	414.205	315.449

XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind

bis unter 15	40	11
15 bis unter 20	209.848	165.545
20 bis unter 25	649.699	452.219
25 bis unter 30	643.423	434.762
30 bis unter 35	632.011	452.315
35 bis unter 40	791.378	625.839
40 bis unter 45	1.064.169	877.552
45 bis unter 50	1.251.641	1.068.836
50 bis unter 55	1.228.616	1.158.236
55 bis unter 60	1.162.056	1.298.817
60 bis unter 65	454.418	725.084
65 bis unter 70	18.420	60.537
70 bis unter 75	2.261	6.337
75 bis unter 80	1.653	2.311
80 und älter	1.226	1.732
Zusammen	8.110.859	7.330.133

Absolut Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen		
bis unter 15	34	37
15 bis unter 20	278.114	1.005.237
20 bis unter 25	872.020	2.584.494
25 bis unter 30	813.110	2.178.473
30 bis unter 35	738.817	1.780.615
35 bis unter 40	1.066.183	2.145.624
40 bis unter 45	1.636.317	2.638.715
45 bis unter 50	1.872.783	2.795.607
50 bis unter 55	2.020.432	2.517.616
55 bis unter 60	2.064.481	2.187.352
60 bis unter 65	810.451	1.070.500
65 bis unter 70	45.306	86.503
70 bis unter 75	5.686	9.597
75 bis unter 80	1.772	3.134
80 und älter	2.213	2.189
Zusammen	12.227.719	21.005.693

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	5	14	14	11
15 bis unter 20	413.135	540.590	406.589	531.141
20 bis unter 25	1.220.181	1.364.737	1.157.602	1.287.978
25 bis unter 30	1.157.632	1.251.956	1.130.035	1.231.840
30 bis unter 35	1.053.762	1.220.240	987.803	1.160.910
35 bis unter 40	929.369	1.071.953	882.004	1.012.951
40 bis unter 45	1.099.885	1.191.808	933.214	1.013.497
45 bis unter 50	1.387.898	1.378.393	1.209.481	1.195.633
50 bis unter 55	1.396.998	1.293.652	1.244.344	1.160.087
55 bis unter 60	1.148.097	1.062.761	1.050.475	958.782
60 bis unter 65	544.457	584.301	544.046	565.372
65 bis unter 70	17.267	22.288	17.595	25.116
70 bis unter 75	1.382	1.867	920	2.064
75 bis unter 80	426	537	327	777
80 und älter	340	452	345	409
Zusammen	10.370.834	10.985.549	9.564.794	10.146.568
II. Neubildungen				
bis unter 15	2	0		0
15 bis unter 20	20.707	26.064	18.093	23.820
20 bis unter 25	113.822	119.492	100.094	105.935
25 bis unter 30	209.315	173.750	213.277	178.840
30 bis unter 35	333.012	229.014	344.488	227.199
35 bis unter 40	505.677	264.334	557.348	269.200
40 bis unter 45	1.094.523	430.442	1.047.229	430.816
45 bis unter 50	2.015.698	837.779	1.997.840	812.857
50 bis unter 55	2.535.333	1.335.492	2.614.851	1.409.942
55 bis unter 60	2.240.961	1.841.630	2.349.215	1.915.909
60 bis unter 65	1.378.081	1.535.093	1.524.718	1.713.017
65 bis unter 70	73.032	92.875	92.940	131.413
70 bis unter 75	2.777	8.842	3.187	9.384
75 bis unter 80	715	4.154	1.171	3.314
80 und älter	476	1.284	288	1.388
Zusammen	10.524.131	6.900.245	10.864.739	7.233.034

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0	0		0
15 bis unter 20	6.198	3.692	5.330	3.390
20 bis unter 25	22.501	12.449	21.964	11.069
25 bis unter 30	31.686	18.979	32.165	20.861
30 bis unter 35	38.336	25.725	36.083	27.030
35 bis unter 40	43.535	22.923	39.934	26.757
40 bis unter 45	58.705	32.485	62.431	33.189
45 bis unter 50	81.592	49.361	86.598	46.739
50 bis unter 55	82.992	59.259	76.993	61.008
55 bis unter 60	57.604	56.526	57.842	65.363
60 bis unter 65	35.655	49.369	43.340	52.083
65 bis unter 70	1.603	1.794	1.845	3.230
70 bis unter 75	124	314	84	534
75 bis unter 80	276	208	78	160
80 und älter	95	75	58	91
Zusammen	460.902	333.159	464.745	351.504

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

bis unter 15	43	0		9
15 bis unter 20	13.826	12.313	14.165	11.690
20 bis unter 25	63.677	45.058	61.411	42.795
25 bis unter 30	94.238	59.666	102.990	61.685
30 bis unter 35	124.954	73.150	126.280	75.585
35 bis unter 40	141.550	101.296	139.886	97.563
40 bis unter 45	206.194	167.709	200.047	154.728
45 bis unter 50	311.200	286.459	288.914	273.791
50 bis unter 55	354.503	375.701	330.502	374.464
55 bis unter 60	320.323	415.824	306.277	404.612
60 bis unter 65	172.277	317.606	184.748	311.689
65 bis unter 70	4.909	16.015	9.558	17.401
70 bis unter 75	715	1.317	247	1.006
75 bis unter 80	136	462	45	555
80 und älter	201	231	224	332
Zusammen	1.808.746	1.872.807	1.765.294	1.827.905

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	56	45	29	96
15 bis unter 20	351.302	238.713	362.722	239.456
20 bis unter 25	2.094.799	1.268.941	2.112.722	1.286.632
25 bis unter 30	3.090.586	1.866.589	3.256.193	1.992.361
30 bis unter 35	3.586.546	2.279.484	3.752.656	2.460.738
35 bis unter 40	3.690.581	2.369.021	4.045.597	2.519.488
40 bis unter 45	4.962.970	3.046.635	4.869.152	2.984.118
45 bis unter 50	6.769.455	4.019.874	6.824.365	4.013.158
50 bis unter 55	6.947.824	4.049.082	7.330.380	4.354.972
55 bis unter 60	6.172.191	3.644.479	6.552.372	3.937.783
60 bis unter 65	3.412.756	2.541.901	4.197.012	2.924.333
65 bis unter 70	104.887	105.081	158.767	138.890
70 bis unter 75	1.791	1.024	1.054	1.382
75 bis unter 80	820	635	437	881
80 und älter	227	310	366	296
Zusammen	41.186.791	25.431.814	43.463.824	26.854.584
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	47	3		5
15 bis unter 20	71.227	61.120	76.105	65.118
20 bis unter 25	327.850	243.760	342.531	251.001
25 bis unter 30	421.335	315.847	453.798	326.007
30 bis unter 35	469.904	1.102.610	492.381	387.719
35 bis unter 40	528.593	414.513	544.058	426.294
40 bis unter 45	744.291	606.404	722.226	565.034
45 bis unter 50	1.102.283	846.730	1.068.537	848.303
50 bis unter 55	1.231.946	913.546	1.284.555	993.684
55 bis unter 60	947.302	929.408	970.994	983.447
60 bis unter 65	451.887	640.472	515.776	701.857
65 bis unter 70	14.813	28.710	19.251	33.467
70 bis unter 75	1.007	1.805	658	1.505
75 bis unter 80	396	1.074	528	1.497
80 und älter	218	347	267	681
Zusammen	6.313.099	6.106.349	6.491.665	5.585.619

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	57	0	122	0
15 bis unter 20	18.565	22.291	19.154	21.366
20 bis unter 25	70.598	72.724	67.837	69.300
25 bis unter 30	92.098	94.371	93.406	91.796
30 bis unter 35	90.434	110.084	96.544	115.601
35 bis unter 40	96.200	118.054	100.465	120.562
40 bis unter 45	133.843	164.080	123.151	151.198
45 bis unter 50	214.005	244.736	207.076	246.829
50 bis unter 55	268.879	309.115	274.004	319.516
55 bis unter 60	313.524	358.988	321.845	374.946
60 bis unter 65	207.624	282.202	232.547	300.790
65 bis unter 70	8.021	14.145	9.761	16.698
70 bis unter 75	835	1.838	743	1.855
75 bis unter 80	154	702	458	654
80 und älter	82	269	96	243
Zusammen	1.514.919	1.793.599	1.547.209	1.831.354

VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes

bis unter 15	4	10	4	10
15 bis unter 20	36.719	40.704	35.159	37.446
20 bis unter 25	133.612	113.411	121.103	103.295
25 bis unter 30	160.952	134.680	164.938	130.655
30 bis unter 35	176.914	164.788	181.344	159.673
35 bis unter 40	180.994	172.781	186.264	167.920
40 bis unter 45	247.752	225.343	228.842	206.562
45 bis unter 50	337.406	288.046	324.029	287.699
50 bis unter 55	354.044	317.777	369.144	327.394
55 bis unter 60	325.389	288.834	312.810	297.109
60 bis unter 65	149.932	182.641	169.691	193.959
65 bis unter 70	5.173	6.254	5.592	8.107
70 bis unter 75	200	325	357	379
75 bis unter 80	70	194	63	324
80 und älter	12	40	9	30
Zusammen	2.109.173	1.935.828	2.099.349	1.920.562

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	0	0	13	35
15 bis unter 20	49.714	47.090	50.898	49.104
20 bis unter 25	193.503	172.054	174.596	164.829
25 bis unter 30	265.283	225.405	272.092	229.909
30 bis unter 35	310.433	317.519	317.690	323.942
35 bis unter 40	365.845	422.820	384.209	440.726
40 bis unter 45	650.164	836.365	617.775	784.300
45 bis unter 50	1.132.129	1.663.324	1.071.354	1.598.052
50 bis unter 55	1.483.008	2.552.063	1.444.072	2.587.445
55 bis unter 60	1.584.573	3.662.051	1.599.485	3.258.085
60 bis unter 65	1.083.583	3.457.826	1.208.655	2.982.170
65 bis unter 70	45.954	147.900	67.395	204.014
70 bis unter 75	3.691	13.111	2.855	14.635
75 bis unter 80	1.703	8.308	1.546	7.307
80 und älter	1.605	3.365	1.620	3.567
Zusammen	7.171.188	13.529.201	7.214.255	12.648.120
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	62	51	55	68
15 bis unter 20	1.062.055	1.302.740	952.600	1.148.432
20 bis unter 25	3.426.805	3.363.398	2.888.142	2.797.679
25 bis unter 30	3.938.917	3.538.424	3.418.325	3.057.917
30 bis unter 35	4.024.006	3.921.959	3.358.722	3.278.337
35 bis unter 40	3.764.343	3.770.996	3.120.257	3.053.225
40 bis unter 45	4.572.786	4.383.823	3.319.407	3.142.233
45 bis unter 50	5.828.020	5.231.377	4.318.162	3.750.859
50 bis unter 55	6.534.600	5.114.947	4.568.666	3.797.602
55 bis unter 60	5.117.833	4.387.202	4.002.845	3.391.444
60 bis unter 65	2.325.587	2.486.309	2.091.423	2.115.013
65 bis unter 70	69.445	94.976	66.896	98.785
70 bis unter 75	4.093	7.178	3.219	5.215
75 bis unter 80	999	1.915	814	1.996
80 und älter	922	990	362	1.054
Zusammen	40.670.473	37.606.285	32.109.895	29.639.859

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	11	4	49	11
15 bis unter 20	375.837	419.938	368.115	414.119
20 bis unter 25	1.152.730	1.202.483	1.105.565	1.146.816
25 bis unter 30	1.058.841	1.214.624	1.072.477	1.216.116
30 bis unter 35	933.202	1.196.363	938.392	1.244.912
35 bis unter 40	877.112	1.154.700	892.389	1.185.962
40 bis unter 45	1.157.838	1.501.330	1.098.461	1.407.682
45 bis unter 50	1.636.939	2.010.098	1.578.701	1.949.256
50 bis unter 55	1.687.075	2.125.911	1.745.771	2.161.455
55 bis unter 60	1.459.498	1.882.806	1.500.370	1.940.153
60 bis unter 65	707.561	1.099.284	803.419	1.192.987
65 bis unter 70	24.138	48.588	30.494	61.692
70 bis unter 75	1.577	4.875	1.836	4.420
75 bis unter 80	462	1.945	509	1.797
80 und älter	421	914	511	1.097
Zusammen	11.073.242	13.863.863	11.137.059	13.928.475
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	0	41		0
15 bis unter 20	73.977	147.767	74.978	152.686
20 bis unter 25	232.388	436.477	225.444	418.103
25 bis unter 30	223.557	426.142	238.551	439.159
30 bis unter 35	198.937	376.056	199.989	388.590
35 bis unter 40	191.576	325.600	195.749	319.855
40 bis unter 45	274.478	388.609	259.382	376.852
45 bis unter 50	380.319	503.169	372.718	493.810
50 bis unter 55	393.214	507.289	399.392	531.397
55 bis unter 60	340.108	448.483	350.395	477.221
60 bis unter 65	162.294	274.879	199.145	296.273
65 bis unter 70	3.509	9.873	7.085	12.590
70 bis unter 75	335	660	61	629
75 bis unter 80	108	424	93	531
80 und älter	91	252	135	223
Zusammen	2.474.891	3.845.721	2.523.117	3.907.919

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	36	92	12	63
15 bis unter 20	306.083	466.586	307.392	478.589
20 bis unter 25	1.487.534	2.145.015	1.478.997	2.176.713
25 bis unter 30	2.010.507	2.938.964	2.144.407	3.136.768
30 bis unter 35	2.331.038	3.686.764	2.468.034	3.909.924
35 bis unter 40	2.983.336	4.381.313	3.158.580	4.588.008
40 bis unter 45	5.024.965	6.507.891	4.980.690	6.332.417
45 bis unter 50	8.997.265	9.321.729	8.217.365	9.417.021
50 bis unter 55	10.111.934	10.704.857	10.297.989	11.320.780
55 bis unter 60	9.272.919	11.024.823	9.661.519	11.400.881
60 bis unter 65	5.556.840	8.151.488	6.498.989	9.041.258
65 bis unter 70	199.639	339.251	247.181	450.322
70 bis unter 75	7.983	12.475	6.654	13.151
75 bis unter 80	2.764	5.519	2.985	5.063
80 und älter	1.167	1.655	1.149	2.087
Zusammen	48.294.010	59.688.422	49.471.943	62.273.045
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	0	4	8	4
15 bis unter 20	127.500	31.863	123.197	28.514
20 bis unter 25	424.159	116.250	392.921	109.268
25 bis unter 30	509.851	148.832	525.925	146.148
30 bis unter 35	530.962	173.152	547.008	173.378
35 bis unter 40	522.138	190.445	519.304	193.737
40 bis unter 45	700.767	266.692	637.425	250.205
45 bis unter 50	970.588	386.846	897.081	387.457
50 bis unter 55	899.757	461.305	860.656	465.250
55 bis unter 60	634.941	491.152	631.347	501.913
60 bis unter 65	313.583	363.157	333.006	381.297
65 bis unter 70	10.628	19.014	14.646	23.342
70 bis unter 75	681	3.845	711	3.522
75 bis unter 80	315	1.424	254	1.471
80 und älter	212	657	256	812
Zusammen	5.646.082	2.654.638	5.483.745	2.666.318

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett				
bis unter 15	0	0		0
15 bis unter 20	39.331	0	36.605	0
20 bis unter 25	431.836	0	413.115	0
25 bis unter 30	1.148.824	0	1.218.825	0
30 bis unter 35	1.298.186	0	1.435.890	0
35 bis unter 40	684.444	0	787.160	0
40 bis unter 45	186.698	0	194.849	0
45 bis unter 50	20.131	0	23.150	0
50 bis unter 55	6.917	0	6.531	0
55 bis unter 60	4.065	0	3.903	0
60 bis unter 65	2.301	0	2.214	0
65 bis unter 70	16	0	42	0
70 bis unter 75	0	0		0
75 bis unter 80	0	0	4	0
80 und älter	0	0		0
Zusammen	3.822.749	0	4.122.288	0
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben				
bis unter 15	3	0		0
15 bis unter 20	259	109	315	314
20 bis unter 25	1.719	711	1.227	450
25 bis unter 30	3.940	522	3.280	430
30 bis unter 35	5.476	1.173	5.488	802
35 bis unter 40	3.153	704	3.643	539
40 bis unter 45	1.227	448	2.150	390
45 bis unter 50	744	712	626	1.659
50 bis unter 55	842	424	1.313	584
55 bis unter 60	1.008	926	1.001	970
60 bis unter 65	348	771	361	564
65 bis unter 70	1	0	5	0
70 bis unter 75	0	0		0
75 bis unter 80	0	0		0
80 und älter	0	0		0
Zusammen	18.720	6.500	19.409	6.702

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien				
bis unter 15	0	29	28	28
15 bis unter 20	10.308	13.898	11.350	13.641
20 bis unter 25	51.084	38.306	49.602	40.241
25 bis unter 30	61.496	38.639	56.864	38.339
30 bis unter 35	49.965	41.006	45.725	37.038
35 bis unter 40	42.812	33.203	42.905	33.469
40 bis unter 45	50.527	42.259	49.312	39.430
45 bis unter 50	72.933	49.180	65.621	52.944
50 bis unter 55	73.121	52.892	73.064	54.532
55 bis unter 60	57.632	43.573	64.713	43.961
60 bis unter 65	36.258	31.118	33.969	33.840
65 bis unter 70	404	1.227	1.027	1.380
70 bis unter 75	6	100	64	257
75 bis unter 80	22	52		2
80 und älter	14	28		0
Zusammen	506.582	385.510	494.244	389.102

XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind

bis unter 15	39	104	56	30
15 bis unter 20	272.827	256.166	283.245	258.178
20 bis unter 25	892.909	669.923	876.764	664.844
25 bis unter 30	1.018.945	672.421	1.069.102	676.472
30 bis unter 35	1.017.260	693.592	1.055.075	702.234
35 bis unter 40	951.857	710.474	998.437	710.160
40 bis unter 45	1.176.056	920.660	1.114.947	844.204
45 bis unter 50	1.572.717	1.262.055	1.541.056	1.178.833
50 bis unter 55	1.616.217	1.395.511	1.642.878	1.375.719
55 bis unter 60	1.398.998	1.383.452	1.410.561	1.376.148
60 bis unter 65	768.268	978.270	849.405	1.007.727
65 bis unter 70	35.124	55.641	37.180	53.396
70 bis unter 75	1.781	5.768	1.632	5.075
75 bis unter 80	756	2.965	937	2.984
80 und älter	1.059	2.063	1.556	2.616
Zusammen	10.724.813	9.009.065	10.882.831	8.858.620

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	31	22	19	86
15 bis unter 20	320.115	1.050.118	308.198	1.012.837
20 bis unter 25	1.070.972	2.946.891	1.013.419	2.726.296
25 bis unter 30	1.117.603	2.719.315	1.114.770	2.663.370
30 bis unter 35	1.055.227	2.310.871	1.003.943	2.295.967
35 bis unter 40	1.104.791	2.017.662	1.048.265	1.934.416
40 bis unter 45	1.614.672	2.462.995	1.428.430	2.214.489
45 bis unter 50	2.385.420	3.164.598	2.193.650	2.891.349
50 bis unter 55	2.776.950	3.088.852	2.630.210	2.989.489
55 bis unter 60	2.644.789	2.504.102	2.519.720	2.461.334
60 bis unter 65	1.461.669	1.520.258	1.534.749	1.547.020
65 bis unter 70	65.997	79.392	73.333	89.548
70 bis unter 75	5.312	8.590	5.350	8.930
75 bis unter 80	2.722	3.235	1.937	4.106
80 und älter	1.563	1.324	1.810	1.863
Zusammen	15.627.833	23.878.225	14.877.803	22.841.100

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	8	20	3.089	1.032
15 bis unter 20	458.869	601.417	473.688	620.210
20 bis unter 25	1.244.738	1.417.309	1.275.456	1.444.175
25 bis unter 30	1.338.680	1.453.583	1.450.029	1.565.749
30 bis unter 35	1.171.263	1.368.416	1.292.013	1.509.541
35 bis unter 40	1.092.515	1.246.128	1.205.268	1.380.124
40 bis unter 45	1.092.468	1.169.039	1.122.421	1.194.577
45 bis unter 50	1.465.573	1.432.893	1.451.850	1.425.582
50 bis unter 55	1.584.297	1.494.571	1.669.254	1.531.700
55 bis unter 60	1.362.879	1.264.863	1.473.629	1.339.239
60 bis unter 65	740.327	744.596	852.433	813.230
65 bis unter 70	27.570	34.088	36.453	42.385
70 bis unter 75	921	2.093	736	1.301
75 bis unter 80	552	1.164	296	363
80 und älter	230	700	198	408
Zusammen	11.580.890	12.230.880	12.306.813	12.869.616
II. Neubildungen				
bis unter 15	0	0	1.331	0
15 bis unter 20	17.153	30.186	20.046	29.251
20 bis unter 25	111.650	131.055	114.128	125.064
25 bis unter 30	255.238	228.911	279.129	225.372
30 bis unter 35	418.072	291.620	487.487	304.434
35 bis unter 40	679.163	348.585	777.239	368.669
40 bis unter 45	1.209.890	504.115	1.241.921	515.838
45 bis unter 50	2.339.271	989.630	2.439.431	1.024.540
50 bis unter 55	3.201.988	1.758.509	3.516.788	1.917.926
55 bis unter 60	2.840.971	2.473.978	3.159.870	2.695.899
60 bis unter 65	2.044.910	2.219.294	2.344.416	2.523.155
65 bis unter 70	112.084	176.235	164.008	194.814
70 bis unter 75	2.888	9.675	2.124	3.843
75 bis unter 80	789	5.602	799	2.110
80 und älter	525	1.629	363	946
Zusammen	13.234.592	9.169.024	14.549.080	9.931.861

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0	0	18	0
15 bis unter 20	5.490	4.571	5.056	3.254
20 bis unter 25	21.465	14.469	22.784	15.912
25 bis unter 30	36.096	25.133	35.101	25.482
30 bis unter 35	43.816	30.529	43.164	29.438
35 bis unter 40	49.597	34.043	52.765	37.427
40 bis unter 45	60.082	43.624	62.028	36.040
45 bis unter 50	91.464	60.473	95.081	57.520
50 bis unter 55	97.001	83.660	98.344	79.103
55 bis unter 60	75.580	83.520	80.827	89.339
60 bis unter 65	51.241	66.546	58.107	71.553
65 bis unter 70	3.476	4.336	3.655	5.529
70 bis unter 75	74	246	80	49
75 bis unter 80	66	166	8	158
80 und älter	46	192	10	12
Zusammen	535.494	451.508	557.028	450.816
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	0	32	21	0
15 bis unter 20	12.832	11.988	13.763	11.705
20 bis unter 25	66.214	46.182	63.137	43.348
25 bis unter 30	121.400	59.769	123.538	73.030
30 bis unter 35	145.190	90.393	157.993	97.013
35 bis unter 40	181.185	124.774	184.136	124.721
40 bis unter 45	221.087	170.616	213.770	168.154
45 bis unter 50	322.935	307.205	338.746	308.978
50 bis unter 55	391.307	457.264	412.960	436.620
55 bis unter 60	365.258	492.513	360.630	521.809
60 bis unter 65	228.486	378.144	237.874	393.361
65 bis unter 70	10.891	21.617	12.538	24.712
70 bis unter 75	436	968	161	195
75 bis unter 80	173	670	281	310
80 und älter	498	426	26	50
Zusammen	2.067.892	2.162.561	2.119.574	2.204.006

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	3	122	2.921	1.062
15 bis unter 20	438.287	301.543	457.864	312.466
20 bis unter 25	2.390.228	1.590.905	2.392.420	1.642.362
25 bis unter 30	4.093.050	2.599.629	4.188.332	2.813.724
30 bis unter 35	4.825.305	3.201.371	5.050.550	3.430.280
35 bis unter 40	5.259.722	3.460.744	5.710.558	3.888.785
40 bis unter 45	5.903.902	3.788.962	6.104.513	3.947.235
45 bis unter 50	8.335.889	5.205.678	8.652.774	5.474.822
50 bis unter 55	9.383.065	5.714.757	10.254.894	6.472.599
55 bis unter 60	8.449.601	5.257.850	9.399.184	6.015.493
60 bis unter 65	5.578.325	3.717.459	6.555.113	4.342.474
65 bis unter 70	183.761	163.841	259.648	209.929
70 bis unter 75	1.733	1.615	863	913
75 bis unter 80	658	774	570	199
80 und älter	361	362	71	233
Zusammen	54.843.890	35.005.612	59.030.275	38.552.576

VI. Krankheiten des Nervensystems

bis unter 15	0	0	421	0
15 bis unter 20	83.172	68.442	79.547	71.755
20 bis unter 25	367.617	263.241	363.130	262.237
25 bis unter 30	521.060	385.253	569.121	419.805
30 bis unter 35	562.563	451.879	622.468	491.163
35 bis unter 40	655.409	528.813	732.480	591.888
40 bis unter 45	819.323	659.806	828.521	689.554
45 bis unter 50	1.220.700	1.014.948	1.298.084	987.262
50 bis unter 55	1.514.831	1.229.761	1.624.788	1.308.937
55 bis unter 60	1.202.791	1.221.265	1.359.229	1.355.565
60 bis unter 65	682.466	897.149	783.686	979.298
65 bis unter 70	26.390	48.468	36.289	54.284
70 bis unter 75	906	1.853	425	868
75 bis unter 80	334	1.319	139	312
80 und älter	208	713	71	166
Zusammen	7.657.770	6.772.910	8.298.399	7.213.094

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	12	4	223	0
15 bis unter 20	19.619	22.894	18.224	22.072
20 bis unter 25	67.274	71.513	72.997	67.545
25 bis unter 30	105.450	101.502	106.832	111.850
30 bis unter 35	107.121	119.635	108.099	135.146
35 bis unter 40	114.082	139.404	120.219	152.377
40 bis unter 45	130.103	169.446	129.779	162.194
45 bis unter 50	225.206	264.653	226.746	267.781
50 bis unter 55	325.909	374.867	328.953	397.751
55 bis unter 60	378.191	452.540	407.268	478.709
60 bis unter 65	300.675	362.729	345.443	399.958
65 bis unter 70	15.724	19.325	17.990	22.476
70 bis unter 75	1.022	1.676	684	554
75 bis unter 80	393	836	286	437
80 und älter	127	251	168	127
Zusammen	1.790.908	2.101.275	1.883.911	2.218.977

VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	0	4	151	0
15 bis unter 20	39.892	43.018	38.493	41.833
20 bis unter 25	127.161	109.093	125.292	103.710
25 bis unter 30	181.353	146.756	191.410	150.600
30 bis unter 35	195.472	180.702	205.076	191.893
35 bis unter 40	218.175	200.654	232.224	216.605
40 bis unter 45	249.591	228.049	248.495	221.312
45 bis unter 50	362.350	319.462	377.731	320.137
50 bis unter 55	420.044	383.944	454.341	394.405
55 bis unter 60	382.558	365.536	420.061	387.892
60 bis unter 65	230.107	235.776	259.045	261.603
65 bis unter 70	5.547	10.173	8.661	10.239
70 bis unter 75	514	297	362	291
75 bis unter 80	141	155	79	126
80 und älter	130	87	97	4
Zusammen	2.413.035	2.223.706	2.561.518	2.300.650

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	0	0	667	999
15 bis unter 20	50.196	53.130	47.360	50.762
20 bis unter 25	184.103	169.037	180.825	170.075
25 bis unter 30	312.257	278.191	317.540	283.042
30 bis unter 35	357.943	378.784	377.805	400.176
35 bis unter 40	444.290	537.486	492.659	605.683
40 bis unter 45	659.100	890.625	657.377	934.127
45 bis unter 50	1.223.863	1.880.195	1.263.292	1.906.697
50 bis unter 55	1.693.396	3.187.331	1.809.717	3.406.617
55 bis unter 60	1.839.980	4.209.823	2.014.034	4.564.106
60 bis unter 65	1.531.156	3.616.489	1.740.493	4.077.256
65 bis unter 70	78.924	234.576	108.794	260.534
70 bis unter 75	3.313	14.712	1.931	5.317
75 bis unter 80	2.138	7.911	1.052	1.887
80 und älter	1.089	4.641	394	792
Zusammen	8.381.748	15.462.931	9.013.940	16.668.070

X. Krankheiten des Atmungssystems

bis unter 15	77	119	9.998	5.026
15 bis unter 20	1.152.611	1.410.781	1.096.023	1.338.062
20 bis unter 25	3.305.436	3.268.476	3.211.829	3.139.242
25 bis unter 30	4.257.492	3.815.003	4.372.980	3.907.235
30 bis unter 35	4.160.543	4.120.433	4.307.110	4.178.830
35 bis unter 40	4.133.063	4.053.645	4.239.107	4.095.858
40 bis unter 45	4.321.672	4.080.944	4.019.511	3.723.431
45 bis unter 50	5.854.957	5.146.677	5.338.859	4.627.310
50 bis unter 55	6.528.434	5.594.573	6.218.715	5.249.309
55 bis unter 60	5.802.971	5.043.449	5.732.237	4.916.334
60 bis unter 65	3.179.169	3.035.607	3.438.526	3.134.502
65 bis unter 70	107.997	142.205	141.122	153.186
70 bis unter 75	4.389	7.433	3.277	3.992
75 bis unter 80	1.302	2.834	882	1.091
80 und älter	294	1.326	508	815
Zusammen	42.810.407	39.723.505	42.130.684	38.474.223

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	1	12	2.632	1.006
15 bis unter 20	369.756	419.899	356.443	408.062
20 bis unter 25	1.079.387	1.144.504	1.021.603	1.091.123
25 bis unter 30	1.166.154	1.339.345	1.196.846	1.356.849
30 bis unter 35	1.031.071	1.355.090	1.060.573	1.386.338
35 bis unter 40	1.015.183	1.353.001	1.094.363	1.451.742
40 bis unter 45	1.147.027	1.495.446	1.147.853	1.482.593
45 bis unter 50	1.694.477	2.143.856	1.686.895	2.091.153
50 bis unter 55	1.942.253	2.537.984	2.037.796	2.598.401
55 bis unter 60	1.730.339	2.281.025	1.841.976	2.423.386
60 bis unter 65	981.440	1.383.109	1.126.710	1.527.282
65 bis unter 70	32.163	70.132	46.137	75.705
70 bis unter 75	1.095	4.527	751	1.713
75 bis unter 80	631	2.044	300	750
80 und älter	385	1.027	246	336
Zusammen	12.191.362	15.531.001	12.621.124	15.896.439

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	31	0	550	999
15 bis unter 20	77.108	163.465	75.538	162.581
20 bis unter 25	230.540	454.064	226.790	450.551
25 bis unter 30	260.237	504.052	281.865	528.967
30 bis unter 35	227.744	429.959	244.928	459.075
35 bis unter 40	218.420	389.519	245.998	415.787
40 bis unter 45	263.207	403.143	268.491	413.126
45 bis unter 50	405.164	548.724	412.351	544.942
50 bis unter 55	469.828	620.234	497.979	653.841
55 bis unter 60	404.450	569.728	451.514	628.337
60 bis unter 65	233.459	360.780	282.110	406.782
65 bis unter 70	7.718	15.450	10.678	20.009
70 bis unter 75	342	1.036	440	231
75 bis unter 80	81	1.138	65	723
80 und älter	32	160	35	150
Zusammen	2.798.361	4.461.452	2.999.332	4.686.101

XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	77	47	7.245	3.016
15 bis unter 20	326.042	511.190	326.258	494.984
20 bis unter 25	1.533.354	2.267.822	1.515.154	2.218.395
25 bis unter 30	2.483.082	3.722.133	2.616.638	3.843.618
30 bis unter 35	2.861.378	4.563.336	3.062.582	4.771.769
35 bis unter 40	3.831.867	5.601.990	4.093.515	5.983.969
40 bis unter 45	5.600.012	7.175.303	5.640.541	7.241.067
45 bis unter 50	9.444.966	10.960.501	9.777.244	11.114.624
50 bis unter 55	12.459.610	13.814.983	13.343.722	14.810.117
55 bis unter 60	11.916.606	14.250.519	13.128.933	15.749.861
60 bis unter 65	8.207.186	10.867.793	9.529.534	12.249.192
65 bis unter 70	320.351	532.199	419.772	597.410
70 bis unter 75	8.571	14.480	5.125	6.713
75 bis unter 80	2.820	6.946	1.332	3.236
80 und älter	1.026	2.016	212	712
Zusammen	58.996.948	74.291.258	63.467.807	79.088.683

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	2	4	1.413	0
15 bis unter 20	123.976	30.639	118.820	31.405
20 bis unter 25	382.773	111.548	364.273	107.946
25 bis unter 30	554.915	163.608	562.421	170.485
30 bis unter 35	588.801	192.586	604.861	202.874
35 bis unter 40	601.347	225.561	621.285	233.378
40 bis unter 45	661.860	270.806	665.181	278.828
45 bis unter 50	955.454	419.202	953.404	413.143
50 bis unter 55	971.212	547.407	1.001.381	581.411
55 bis unter 60	710.673	616.385	768.457	642.787
60 bis unter 65	418.025	447.058	472.307	490.054
65 bis unter 70	17.287	28.652	21.065	33.527
70 bis unter 75	838	2.687	530	887
75 bis unter 80	534	1.281	215	373
80 und älter	124	924	36	145
Zusammen	5.987.821	3.058.348	6.155.649	3.187.243

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15	0	0	2.177	0
15 bis unter 20	37.706	0	33.565	0
20 bis unter 25	412.529	0	383.990	0
25 bis unter 30	1.337.307	0	1.328.974	0
30 bis unter 35	1.502.011	0	1.548.096	0
35 bis unter 40	854.309	0	916.743	0
40 bis unter 45	206.163	0	230.360	0
45 bis unter 50	28.735	0	28.816	0
50 bis unter 55	12.973	0	11.928	0
55 bis unter 60	9.311	0	9.131	0
60 bis unter 65	3.804	0	4.188	0
65 bis unter 70	166	0	572	0
70 bis unter 75	2	0	0	0
75 bis unter 80	0	0	0	0
80 und älter	0	0	0	0
Zusammen	4.405.016	0	4.498.540	0

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben				
bis unter 15	16	0	1	0
15 bis unter 20	158	103	120	229
20 bis unter 25	1.236	602	770	310
25 bis unter 30	3.381	645	4.647	871
30 bis unter 35	6.019	883	5.497	513
35 bis unter 40	5.178	455	6.355	747
40 bis unter 45	2.423	677	1.494	384
45 bis unter 50	1.740	976	1.417	1.357
50 bis unter 55	1.141	1.112	1.474	721
55 bis unter 60	1.160	1.627	1.248	971
60 bis unter 65	317	328	423	913
65 bis unter 70	34	3	32	0
70 bis unter 75	0	0	0	0
75 bis unter 80	0	0	0	0
80 und älter	0	0	0	0
Zusammen	22.803	7.411	23.478	7.016

XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien				
bis unter 15	47	113	116	0
15 bis unter 20	12.821	12.896	12.501	11.659
20 bis unter 25	51.402	41.878	56.702	35.853
25 bis unter 30	69.967	51.608	77.323	51.463
30 bis unter 35	62.003	47.959	62.829	47.883
35 bis unter 40	60.114	39.688	73.230	46.476
40 bis unter 45	58.575	42.705	64.186	43.084
45 bis unter 50	84.908	59.412	82.565	59.771
50 bis unter 55	94.642	69.489	99.235	67.362
55 bis unter 60	70.938	58.050	81.491	69.106
60 bis unter 65	41.488	41.775	46.187	42.587
65 bis unter 70	1.228	862	2.380	2.281
70 bis unter 75	199	84	150	12
75 bis unter 80	0	11	10	35
80 und älter	0	7	0	0
Zusammen	608.332	466.537	658.905	477.572

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	17	71	2.157	1.006
15 bis unter 20	307.627	286.984	309.852	286.957
20 bis unter 25	934.317	732.567	950.473	748.470
25 bis unter 30	1.230.409	810.731	1.311.228	885.305
30 bis unter 35	1.226.195	846.867	1.329.636	905.564
35 bis unter 40	1.212.666	894.584	1.328.672	998.651
40 bis unter 45	1.264.929	996.619	1.329.254	1.040.708
45 bis unter 50	1.773.121	1.434.423	1.849.191	1.497.145
50 bis unter 55	1.998.961	1.767.856	2.189.863	1.892.040
55 bis unter 60	1.772.198	1.811.459	2.021.713	2.013.285
60 bis unter 65	1.092.459	1.299.140	1.340.732	1.507.397
65 bis unter 70	50.582	81.944	66.852	88.856
70 bis unter 75	2.402	5.510	772	1.748
75 bis unter 80	844	3.431	930	838
80 und älter	890	2.581	123	690
Zusammen	12.867.617	10.974.767	14.031.448	11.868.660

XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen

bis unter 15	1	60	3.020	4.999
15 bis unter 20	334.424	1.069.295	364.084	1.158.082
20 bis unter 25	1.080.694	2.918.363	1.199.511	3.112.886
25 bis unter 30	1.325.410	3.167.467	1.514.621	3.598.058
30 bis unter 35	1.197.979	2.722.120	1.382.153	3.231.715
35 bis unter 40	1.284.708	2.412.999	1.500.866	3.100.864
40 bis unter 45	1.592.423	2.565.702	1.757.281	3.055.454
45 bis unter 50	2.513.230	3.389.350	2.765.070	4.093.602
50 bis unter 55	3.219.231	3.661.941	3.747.341	4.670.146
55 bis unter 60	3.144.034	3.152.707	3.766.451	4.192.526
60 bis unter 65	1.958.432	1.930.863	2.443.725	2.533.539
65 bis unter 70	94.257	116.991	128.466	146.620
70 bis unter 75	6.779	9.955	4.775	5.442
75 bis unter 80	1.867	4.644	1.344	2.460
80 und älter	1.558	2.148	672	1.807
Zusammen	17.755.027	27.124.605	20.579.380	32.908.200

Prozentual Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten		
bis unter 15	3,2%	0,5%
15 bis unter 20	9,5%	8,6%
20 bis unter 25	7,6%	7,3%
25 bis unter 30	5,8%	6,2%
30 bis unter 35	4,9%	5,8%
35 bis unter 40	4,4%	5,1%
40 bis unter 45	3,8%	4,3%
45 bis unter 50	3,3%	3,7%
50 bis unter 55	3,1%	3,2%
55 bis unter 60	2,8%	2,7%
60 bis unter 65	2,5%	2,3%
65 bis unter 70	2,1%	2,3%
70 bis unter 75	2,6%	1,7%
75 bis unter 80	2,0%	1,8%
80 und älter	1,9%	1,3%
Zusammen	3,9%	4,2%
II. Neubildungen		
bis unter 15	0,2%	0,5%
15 bis unter 20	0,5%	0,6%
20 bis unter 25	0,9%	1,0%
25 bis unter 30	1,4%	1,2%
30 bis unter 35	2,3%	1,6%
35 bis unter 40	4,0%	1,6%
40 bis unter 45	6,0%	2,1%
45 bis unter 50	7,8%	2,9%
50 bis unter 55	7,9%	4,3%
55 bis unter 60	7,8%	5,7%
60 bis unter 65	9,6%	7,2%
65 bis unter 70	12,2%	9,5%
70 bis unter 75	9,8%	12,0%
75 bis unter 80	7,8%	11,1%
80 und älter	5,8%	9,3%
Zusammen	6,0%	3,4%

Prozentual Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems		
bis unter 15	0,00%	0,00%
15 bis unter 20	0,15%	0,07%
20 bis unter 25	0,15%	0,12%
25 bis unter 30	0,18%	0,13%
30 bis unter 35	0,25%	0,18%
35 bis unter 40	0,28%	0,15%
40 bis unter 45	0,28%	0,16%
45 bis unter 50	0,29%	0,17%
50 bis unter 55	0,25%	0,18%
55 bis unter 60	0,21%	0,22%
60 bis unter 65	0,20%	0,29%
65 bis unter 70	0,16%	0,46%
70 bis unter 75	0,17%	0,60%
75 bis unter 80	1,55%	1,03%
80 und älter	1,74%	1,21%
Zusammen	0,24%	0,18%
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten		
bis unter 15	0,00%	1,29%
15 bis unter 20	0,30%	0,23%
20 bis unter 25	0,43%	0,28%
25 bis unter 30	0,61%	0,35%
30 bis unter 35	0,80%	0,46%
35 bis unter 40	0,93%	0,54%
40 bis unter 45	1,03%	0,76%
45 bis unter 50	1,09%	0,95%
50 bis unter 55	1,07%	1,15%
55 bis unter 60	1,12%	1,33%
60 bis unter 65	1,10%	1,35%
65 bis unter 70	1,48%	1,43%
70 bis unter 75	2,74%	2,13%
75 bis unter 80	5,77%	3,03%
80 und älter	4,16%	3,75%
Zusammen	0,97%	0,89%

Prozentual Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
V. Psychische und Verhaltensstörungen		
bis unter 15	9,34%	10,83%
15 bis unter 20	6,69%	3,26%
20 bis unter 25	12,25%	6,63%
25 bis unter 30	15,61%	10,14%
30 bis unter 35	17,55%	10,94%
35 bis unter 40	18,36%	11,31%
40 bis unter 45	17,80%	11,23%
45 bis unter 50	16,66%	10,97%
50 bis unter 55	15,82%	10,80%
55 bis unter 60	15,31%	9,83%
60 bis unter 65	13,78%	8,89%
65 bis unter 70	11,48%	7,29%
70 bis unter 75	3,10%	2,68%
75 bis unter 80	2,18%	3,08%
80 und älter	5,71%	3,86%
Zusammen	15,96%	10,09%
VI. Krankheiten des Nervensystems		
bis unter 15	0,17%	0,00%
15 bis unter 20	1,77%	1,16%
20 bis unter 25	2,20%	1,56%
25 bis unter 30	2,54%	1,94%
30 bis unter 35	2,80%	2,15%
35 bis unter 40	3,11%	2,41%
40 bis unter 45	3,43%	2,56%
45 bis unter 50	3,46%	2,60%
50 bis unter 55	3,26%	2,72%
55 bis unter 60	2,93%	2,66%
60 bis unter 65	2,48%	2,64%
65 bis unter 70	2,19%	3,06%
70 bis unter 75	2,14%	2,72%
75 bis unter 80	2,28%	2,54%
80 und älter	0,82%	2,48%
Zusammen	3,03%	2,44%

Prozentual Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde		
bis unter 15	0,00%	0,00%
15 bis unter 20	0,49%	0,47%
20 bis unter 25	0,50%	0,47%
25 bis unter 30	0,54%	0,53%
30 bis unter 35	0,55%	0,61%
35 bis unter 40	0,54%	0,61%
40 bis unter 45	0,55%	0,68%
45 bis unter 50	0,59%	0,75%
50 bis unter 55	0,73%	0,90%
55 bis unter 60	0,84%	1,02%
60 bis unter 65	1,05%	1,16%
65 bis unter 70	1,22%	1,26%
70 bis unter 75	2,28%	1,84%
75 bis unter 80	1,98%	1,45%
80 und älter	1,20%	2,04%
Zusammen	0,66%	0,79%
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes		
bis unter 15	1,27%	0,07%
15 bis unter 20	0,98%	0,85%
20 bis unter 25	0,99%	0,79%
25 bis unter 30	0,97%	0,82%
30 bis unter 35	0,99%	0,94%
35 bis unter 40	1,04%	0,96%
40 bis unter 45	1,04%	0,98%
45 bis unter 50	0,98%	0,98%
50 bis unter 55	1,02%	0,95%
55 bis unter 60	0,94%	0,91%
60 bis unter 65	0,78%	0,80%
65 bis unter 70	0,68%	0,61%
70 bis unter 75	0,62%	0,47%
75 bis unter 80	0,29%	0,35%
80 und älter	0,28%	0,32%
Zusammen	0,98%	0,91%

Prozentual Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems		
bis unter 15	1,77%	0,00%
15 bis unter 20	1,54%	1,12%
20 bis unter 25	1,75%	1,38%
25 bis unter 30	1,94%	1,77%
30 bis unter 35	2,14%	2,24%
35 bis unter 40	2,63%	3,00%
40 bis unter 45	3,22%	4,40%
45 bis unter 50	4,02%	6,29%
50 bis unter 55	4,73%	8,69%
55 bis unter 60	5,63%	10,84%
60 bis unter 65	6,95%	12,48%
65 bis unter 70	8,55%	14,75%
70 bis unter 75	15,90%	22,73%
75 bis unter 80	23,84%	18,88%
80 und älter	18,38%	20,99%
Zusammen	3,92%	6,51%
X. Krankheiten des Atmungssystems		
bis unter 15	9,95%	3,86%
15 bis unter 20	30,02%	26,47%
20 bis unter 25	24,75%	21,99%
25 bis unter 30	21,70%	19,78%
30 bis unter 35	20,20%	19,97%
35 bis unter 40	18,14%	18,08%
40 bis unter 45	15,90%	15,50%
45 bis unter 50	13,81%	13,39%
50 bis unter 55	12,77%	11,93%
55 bis unter 60	11,56%	10,41%
60 bis unter 65	10,14%	9,15%
65 bis unter 70	8,95%	7,92%
70 bis unter 75	9,57%	7,46%
75 bis unter 80	5,60%	8,21%
80 und älter	3,71%	4,49%
Zusammen	15,61%	14,64%

Prozentual Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XI. Krankheiten des Verdauungssystems		
bis unter 15	3,26%	0,34%
15 bis unter 20	13,96%	11,22%
20 bis unter 25	11,46%	10,77%
25 bis unter 30	8,20%	9,26%
30 bis unter 35	6,50%	8,23%
35 bis unter 40	5,92%	7,57%
40 bis unter 45	5,71%	7,30%
45 bis unter 50	5,44%	7,01%
50 bis unter 55	5,07%	6,61%
55 bis unter 60	4,79%	6,04%
60 bis unter 65	4,35%	5,14%
65 bis unter 70	4,23%	4,73%
70 bis unter 75	4,82%	6,97%
75 bis unter 80	5,29%	6,93%
80 und älter	6,98%	3,72%
Zusammen	6,05%	7,25%
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut		
bis unter 15	0,00%	0,00%
15 bis unter 20	1,97%	3,21%
20 bis unter 25	1,81%	3,15%
25 bis unter 30	1,40%	2,74%
30 bis unter 35	1,22%	2,19%
35 bis unter 40	1,20%	1,85%
40 bis unter 45	1,23%	1,80%
45 bis unter 50	1,12%	1,60%
50 bis unter 55	1,07%	1,46%
55 bis unter 60	1,04%	1,37%
60 bis unter 65	0,89%	1,10%
65 bis unter 70	0,86%	1,08%
70 bis unter 75	0,99%	1,16%
75 bis unter 80	0,29%	3,84%
80 und älter	1,51%	0,54%
Zusammen	1,19%	1,79%

Prozentual Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes		
bis unter 15	63,35%	68,34%
15 bis unter 20	9,40%	10,36%
20 bis unter 25	11,71%	15,54%
25 bis unter 30	13,43%	20,01%
30 bis unter 35	15,38%	23,85%
35 bis unter 40	19,37%	27,74%
40 bis unter 45	23,20%	30,32%
45 bis unter 50	25,90%	31,67%
50 bis unter 55	28,23%	31,43%
55 bis unter 60	30,59%	32,70%
60 bis unter 65	31,64%	34,27%
65 bis unter 70	28,77%	30,76%
70 bis unter 75	20,19%	13,72%
75 bis unter 80	12,08%	13,95%
80 und älter	11,31%	12,09%
Zusammen	23,76%	28,71%
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems		
bis unter 15	1,77%	0,20%
15 bis unter 20	3,91%	0,73%
20 bis unter 25	3,68%	0,89%
25 bis unter 30	3,49%	0,99%
30 bis unter 35	3,52%	1,12%
35 bis unter 40	3,49%	1,12%
40 bis unter 45	3,62%	1,16%
45 bis unter 50	3,51%	1,32%
50 bis unter 55	3,02%	1,41%
55 bis unter 60	2,33%	1,56%
60 bis unter 65	2,09%	1,65%
65 bis unter 70	2,06%	1,86%
70 bis unter 75	2,24%	4,09%
75 bis unter 80	2,69%	4,15%
80 und älter	2,04%	3,58%
Zusammen	3,17%	1,30%

Prozentual Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett		
bis unter 15	0,00%	
15 bis unter 20	1,40%	
20 bis unter 25	4,14%	
25 bis unter 30	8,43%	
30 bis unter 35	8,41%	
35 bis unter 40	4,07%	
40 bis unter 45	0,84%	
45 bis unter 50	0,08%	
50 bis unter 55	0,02%	
55 bis unter 60	0,01%	
60 bis unter 65	0,01%	
65 bis unter 70	0,00%	
70 bis unter 75	0,03%	
75 bis unter 80	0,00%	
80 und älter	0,00%	
Zusammen	1,92%	
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben		
bis unter 15	1,55%	9,81%
15 bis unter 20	0,01%	0,01%
20 bis unter 25	0,01%	0,00%
25 bis unter 30	0,03%	0,01%
30 bis unter 35	0,03%	0,00%
35 bis unter 40	0,02%	0,01%
40 bis unter 45	0,01%	0,00%
45 bis unter 50	0,00%	0,00%
50 bis unter 55	0,00%	0,00%
55 bis unter 60	0,00%	0,00%
60 bis unter 65	0,00%	0,00%
65 bis unter 70	0,00%	0,00%
70 bis unter 75	0,00%	0,00%
75 bis unter 80	0,00%	0,00%
80 und älter	0,00%	0,00%
Zusammen	0,01%	0,00%

Prozentual Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien		
bis unter 15	0,11%	1,08%
15 bis unter 20	0,34%	0,29%
20 bis unter 25	0,42%	0,28%
25 bis unter 30	0,38%	0,27%
30 bis unter 35	0,31%	0,24%
35 bis unter 40	0,29%	0,22%
40 bis unter 45	0,25%	0,17%
45 bis unter 50	0,23%	0,17%
50 bis unter 55	0,20%	0,15%
55 bis unter 60	0,18%	0,15%
60 bis unter 65	0,21%	0,12%
65 bis unter 70	0,08%	0,24%
70 bis unter 75	0,01%	0,10%
75 bis unter 80	0,00%	0,19%
80 und älter	0,00%	0,06%
Zusammen	0,25%	0,19%
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind		
bis unter 15	2,21%	0,74%
15 bis unter 20	7,34%	4,44%
20 bis unter 25	6,49%	4,16%
25 bis unter 30	5,88%	3,96%
30 bis unter 35	5,63%	3,95%
35 bis unter 40	5,22%	3,99%
40 bis unter 45	4,77%	4,13%
45 bis unter 50	4,67%	4,29%
50 bis unter 55	4,43%	4,46%
55 bis unter 60	4,33%	4,67%
60 bis unter 65	4,40%	4,61%
65 bis unter 70	4,34%	5,27%
70 bis unter 75	6,48%	7,80%
75 bis unter 80	12,71%	8,25%
80 und älter	12,29%	13,35%
Zusammen	4,93%	4,32%

Prozentual Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen		
bis unter 15	1,88%	2,50%
15 bis unter 20	9,73%	26,96%
20 bis unter 25	8,71%	23,75%
25 bis unter 30	7,43%	19,84%
30 bis unter 35	6,58%	15,57%
35 bis unter 40	7,04%	13,69%
40 bis unter 45	7,34%	12,41%
45 bis unter 50	6,99%	11,22%
50 bis unter 55	7,29%	9,69%
55 bis unter 60	7,69%	7,87%
60 bis unter 65	7,85%	6,81%
65 bis unter 70	10,66%	7,52%
70 bis unter 75	16,30%	11,81%
75 bis unter 80	13,62%	11,18%
80 und älter	22,19%	16,87%
Zusammen	7,43%	12,38%

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	1,3%	3,3%	3,4%	2,4%
15 bis unter 20	11,6%	11,5%	11,8%	11,8%
20 bis unter 25	9,1%	9,5%	9,2%	9,6%
25 bis unter 30	7,0%	7,9%	6,8%	7,9%
30 bis unter 35	6,0%	6,8%	5,7%	6,8%
35 bis unter 40	5,3%	6,1%	5,0%	5,9%
40 bis unter 45	4,6%	5,1%	4,3%	4,8%
45 bis unter 50	3,9%	4,4%	3,7%	4,1%
50 bis unter 55	3,6%	3,7%	3,3%	3,4%
55 bis unter 60	3,4%	3,1%	3,1%	2,8%
60 bis unter 65	2,9%	2,4%	2,6%	2,2%
65 bis unter 70	2,5%	2,1%	2,0%	1,8%
70 bis unter 75	4,0%	2,5%	3,1%	2,8%
75 bis unter 80	3,3%	1,6%	2,7%	2,3%
80 und älter	3,9%	3,2%	3,8%	2,4%
Zusammen	4,7%	5,0%	4,5%	4,8%
II. Neubildungen				
bis unter 15	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
15 bis unter 20	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%
20 bis unter 25	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
25 bis unter 30	1,3%	1,1%	1,3%	1,1%
30 bis unter 35	1,9%	1,3%	2,0%	1,3%
35 bis unter 40	2,9%	1,5%	3,2%	1,6%
40 bis unter 45	4,6%	1,9%	4,8%	2,1%
45 bis unter 50	5,7%	2,7%	6,2%	2,8%
50 bis unter 55	6,5%	3,9%	7,0%	4,1%
55 bis unter 60	6,6%	5,3%	7,0%	5,7%
60 bis unter 65	7,3%	6,3%	7,3%	6,8%
65 bis unter 70	10,7%	8,6%	10,8%	9,6%
70 bis unter 75	8,1%	12,0%	10,8%	12,7%
75 bis unter 80	5,6%	12,3%	9,6%	9,9%
80 und älter	5,5%	9,0%	3,2%	8,3%
Zusammen	4,8%	3,1%	5,1%	3,4%

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15 bis unter 20	0,17%	0,08%	0,15%	0,08%
20 bis unter 25	0,17%	0,09%	0,17%	0,08%
25 bis unter 30	0,19%	0,12%	0,19%	0,13%
30 bis unter 35	0,22%	0,14%	0,21%	0,16%
35 bis unter 40	0,25%	0,13%	0,23%	0,16%
40 bis unter 45	0,25%	0,14%	0,29%	0,16%
45 bis unter 50	0,23%	0,16%	0,27%	0,16%
50 bis unter 55	0,21%	0,17%	0,21%	0,18%
55 bis unter 60	0,17%	0,16%	0,17%	0,19%
60 bis unter 65	0,19%	0,20%	0,21%	0,21%
65 bis unter 70	0,23%	0,17%	0,21%	0,24%
70 bis unter 75	0,36%	0,42%	0,28%	0,72%
75 bis unter 80	2,15%	0,62%	0,64%	0,48%
80 und älter	1,09%	0,53%	0,64%	0,54%
Zusammen	0,21%	0,15%	0,22%	0,17%
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	10,86%	0,00%	0,00%	1,97%
15 bis unter 20	0,39%	0,26%	0,41%	0,26%
20 bis unter 25	0,47%	0,31%	0,49%	0,32%
25 bis unter 30	0,57%	0,38%	0,62%	0,39%
30 bis unter 35	0,71%	0,41%	0,73%	0,45%
35 bis unter 40	0,80%	0,58%	0,79%	0,57%
40 bis unter 45	0,86%	0,72%	0,91%	0,74%
45 bis unter 50	0,88%	0,91%	0,89%	0,93%
50 bis unter 55	0,91%	1,08%	0,89%	1,09%
55 bis unter 60	0,94%	1,21%	0,91%	1,20%
60 bis unter 65	0,92%	1,30%	0,88%	1,23%
65 bis unter 70	0,72%	1,48%	1,11%	1,27%
70 bis unter 75	2,09%	1,78%	0,83%	1,36%
75 bis unter 80	1,06%	1,37%	0,37%	1,66%
80 und älter	2,31%	1,62%	2,47%	1,98%
Zusammen	0,82%	0,85%	0,82%	0,86%

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	14,14%	10,74%	7,09%	21,05%
15 bis unter 20	9,84%	5,10%	10,50%	5,33%
20 bis unter 25	15,62%	8,85%	16,76%	9,60%
25 bis unter 30	18,60%	11,78%	19,64%	12,74%
30 bis unter 35	20,35%	12,72%	21,58%	14,50%
35 bis unter 40	20,96%	13,50%	22,93%	14,73%
40 bis unter 45	20,71%	13,15%	22,24%	14,26%
45 bis unter 50	19,22%	12,74%	21,14%	13,63%
50 bis unter 55	17,93%	11,68%	19,71%	12,70%
55 bis unter 60	18,13%	10,59%	19,46%	11,65%
60 bis unter 65	18,18%	10,38%	20,02%	11,53%
65 bis unter 70	15,32%	9,70%	18,45%	10,14%
70 bis unter 75	5,22%	1,39%	3,56%	1,87%
75 bis unter 80	6,38%	1,88%	3,59%	2,64%
80 und älter	2,61%	2,17%	4,04%	1,76%
Zusammen	18,69%	11,57%	20,25%	12,61%
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	11,87%	0,72%	0,00%	1,10%
15 bis unter 20	2,00%	1,31%	2,20%	1,45%
20 bis unter 25	2,44%	1,70%	2,72%	1,87%
25 bis unter 30	2,54%	1,99%	2,74%	2,08%
30 bis unter 35	2,67%	6,15%	2,83%	2,28%
35 bis unter 40	3,00%	2,36%	3,08%	2,49%
40 bis unter 45	3,11%	2,62%	3,30%	2,70%
45 bis unter 50	3,13%	2,68%	3,31%	2,88%
50 bis unter 55	3,18%	2,64%	3,45%	2,90%
55 bis unter 60	2,78%	2,70%	2,88%	2,91%
60 bis unter 65	2,41%	2,61%	2,46%	2,77%
65 bis unter 70	2,16%	2,65%	2,24%	2,44%
70 bis unter 75	2,94%	2,44%	2,22%	2,04%
75 bis unter 80	3,08%	3,18%	4,33%	4,48%
80 und älter	2,50%	2,43%	2,95%	4,06%
Zusammen	2,87%	2,78%	3,03%	2,62%

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	14,39%	0,00%	29,83%	0,00%
15 bis unter 20	0,52%	0,48%	0,55%	0,48%
20 bis unter 25	0,53%	0,51%	0,54%	0,52%
25 bis unter 30	0,55%	0,60%	0,56%	0,59%
30 bis unter 35	0,51%	0,61%	0,56%	0,68%
35 bis unter 40	0,55%	0,67%	0,57%	0,71%
40 bis unter 45	0,56%	0,71%	0,56%	0,72%
45 bis unter 50	0,61%	0,78%	0,64%	0,84%
50 bis unter 55	0,69%	0,89%	0,74%	0,93%
55 bis unter 60	0,92%	1,04%	0,96%	1,11%
60 bis unter 65	1,11%	1,15%	1,11%	1,19%
65 bis unter 70	1,17%	1,31%	1,13%	1,22%
70 bis unter 75	2,44%	2,49%	2,51%	2,51%
75 bis unter 80	1,20%	2,08%	3,76%	1,96%
80 und älter	0,94%	1,89%	1,06%	1,45%
Zusammen	0,69%	0,82%	0,72%	0,86%
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	1,01%	2,39%	0,98%	2,19%
15 bis unter 20	1,03%	0,87%	1,02%	0,83%
20 bis unter 25	1,00%	0,79%	0,96%	0,77%
25 bis unter 30	0,97%	0,85%	0,99%	0,84%
30 bis unter 35	1,00%	0,92%	1,04%	0,94%
35 bis unter 40	1,03%	0,98%	1,06%	0,98%
40 bis unter 45	1,03%	0,97%	1,05%	0,99%
45 bis unter 50	0,96%	0,91%	1,00%	0,98%
50 bis unter 55	0,91%	0,92%	0,99%	0,95%
55 bis unter 60	0,96%	0,84%	0,93%	0,88%
60 bis unter 65	0,80%	0,75%	0,81%	0,76%
65 bis unter 70	0,76%	0,58%	0,65%	0,59%
70 bis unter 75	0,58%	0,44%	1,20%	0,51%
75 bis unter 80	0,55%	0,57%	0,52%	0,97%
80 und älter	0,14%	0,28%	0,10%	0,18%
Zusammen	0,96%	0,88%	0,98%	0,90%

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	0,00%	0,00%	3,18%	7,68%
15 bis unter 20	1,39%	1,01%	1,47%	1,09%
20 bis unter 25	1,44%	1,20%	1,39%	1,23%
25 bis unter 30	1,60%	1,42%	1,64%	1,47%
30 bis unter 35	1,76%	1,77%	1,83%	1,91%
35 bis unter 40	2,08%	2,41%	2,18%	2,58%
40 bis unter 45	2,71%	3,61%	2,82%	3,75%
45 bis unter 50	3,21%	5,27%	3,32%	5,43%
50 bis unter 55	3,83%	7,36%	3,88%	7,55%
55 bis unter 60	4,65%	10,64%	4,75%	9,64%
60 bis unter 65	5,77%	14,12%	5,76%	11,76%
65 bis unter 70	6,71%	13,66%	7,83%	14,90%
70 bis unter 75	10,76%	17,73%	9,63%	19,79%
75 bis unter 80	13,26%	24,61%	12,69%	21,86%
80 und älter	18,44%	23,60%	17,90%	21,25%
Zusammen	3,25%	6,15%	3,36%	5,94%
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	15,66%	12,17%	13,45%	14,91%
15 bis unter 20	29,75%	27,83%	27,58%	25,58%
20 bis unter 25	25,55%	23,47%	22,91%	20,87%
25 bis unter 30	23,71%	22,34%	20,62%	19,55%
30 bis unter 35	22,83%	21,88%	19,31%	19,32%
35 bis unter 40	21,38%	21,50%	17,68%	17,85%
40 bis unter 45	19,09%	18,92%	15,16%	15,01%
45 bis unter 50	16,55%	16,58%	13,37%	12,74%
50 bis unter 55	16,86%	14,76%	12,28%	11,08%
55 bis unter 60	15,03%	12,74%	11,89%	10,04%
60 bis unter 65	12,39%	10,15%	9,97%	8,34%
65 bis unter 70	10,14%	8,77%	7,77%	7,21%
70 bis unter 75	11,94%	9,71%	10,86%	7,05%
75 bis unter 80	7,78%	5,67%	6,68%	5,97%
80 und älter	10,59%	6,94%	4,00%	6,28%
Zusammen	18,46%	17,11%	14,96%	13,92%

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	2,78%	0,95%	11,98%	2,41%
15 bis unter 20	10,53%	8,97%	10,66%	9,22%
20 bis unter 25	8,59%	8,39%	8,77%	8,56%
25 bis unter 30	6,37%	7,67%	6,47%	7,78%
30 bis unter 35	5,29%	6,67%	5,40%	7,34%
35 bis unter 40	4,98%	6,58%	5,06%	6,94%
40 bis unter 45	4,83%	6,48%	5,02%	6,73%
45 bis unter 50	4,65%	6,37%	4,89%	6,62%
50 bis unter 55	4,35%	6,13%	4,69%	6,30%
55 bis unter 60	4,29%	5,47%	4,46%	5,74%
60 bis unter 65	3,77%	4,49%	3,83%	4,70%
65 bis unter 70	3,53%	4,49%	3,54%	4,51%
70 bis unter 75	4,60%	6,59%	6,20%	5,98%
75 bis unter 80	3,60%	5,76%	4,18%	5,38%
80 und älter	4,84%	6,41%	5,65%	6,53%
Zusammen	5,03%	6,31%	5,19%	6,54%
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	0,00%	9,79%	0,00%	0,00%
15 bis unter 20	2,07%	3,16%	2,17%	3,40%
20 bis unter 25	1,73%	3,05%	1,79%	3,12%
25 bis unter 30	1,35%	2,69%	1,44%	2,81%
30 bis unter 35	1,13%	2,10%	1,15%	2,29%
35 bis unter 40	1,09%	1,86%	1,11%	1,87%
40 bis unter 45	1,15%	1,68%	1,18%	1,80%
45 bis unter 50	1,08%	1,60%	1,15%	1,68%
50 bis unter 55	1,01%	1,46%	1,07%	1,55%
55 bis unter 60	1,00%	1,30%	1,04%	1,41%
60 bis unter 65	0,86%	1,12%	0,95%	1,17%
65 bis unter 70	0,51%	0,91%	0,82%	0,92%
70 bis unter 75	0,98%	0,89%	0,21%	0,85%
75 bis unter 80	0,84%	1,26%	0,76%	1,59%
80 und älter	1,05%	1,77%	1,49%	1,33%
Zusammen	1,12%	1,75%	1,18%	1,84%

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	9,09%	21,96%	2,93%	13,82%
15 bis unter 20	8,57%	9,97%	8,90%	10,66%
20 bis unter 25	11,09%	14,97%	11,73%	16,24%
25 bis unter 30	12,10%	18,56%	12,93%	20,06%
30 bis unter 35	13,22%	20,57%	14,19%	23,04%
35 bis unter 40	16,94%	24,98%	17,90%	26,83%
40 bis unter 45	20,97%	28,08%	22,75%	30,25%
45 bis unter 50	25,55%	29,55%	25,45%	31,98%
50 bis unter 55	26,09%	30,89%	27,69%	33,02%
55 bis unter 60	27,24%	32,02%	28,70%	33,74%
60 bis unter 65	29,60%	33,28%	31,00%	35,65%
65 bis unter 70	29,16%	31,32%	28,72%	32,88%
70 bis unter 75	23,28%	16,87%	22,46%	17,79%
75 bis unter 80	21,52%	16,35%	24,50%	15,15%
80 und älter	13,41%	11,61%	12,69%	12,43%
Zusammen	21,92%	27,15%	23,05%	29,25%
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	0,00%	0,95%	1,96%	0,88%
15 bis unter 20	3,57%	0,68%	3,57%	0,64%
20 bis unter 25	3,16%	0,81%	3,12%	0,82%
25 bis unter 30	3,07%	0,94%	3,17%	0,93%
30 bis unter 35	3,01%	0,97%	3,14%	1,02%
35 bis unter 40	2,97%	1,09%	2,94%	1,13%
40 bis unter 45	2,92%	1,15%	2,91%	1,20%
45 bis unter 50	2,76%	1,23%	2,78%	1,32%
50 bis unter 55	2,32%	1,33%	2,31%	1,36%
55 bis unter 60	1,87%	1,43%	1,88%	1,49%
60 bis unter 65	1,67%	1,48%	1,59%	1,50%
65 bis unter 70	1,55%	1,76%	1,70%	1,70%
70 bis unter 75	1,99%	5,20%	2,40%	4,76%
75 bis unter 80	2,45%	4,22%	2,08%	4,40%
80 und älter	2,44%	4,61%	2,83%	4,84%
Zusammen	2,56%	1,21%	2,56%	1,25%

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett				
bis unter 15	0,00%		0,00%	
15 bis unter 20	1,10%		1,06%	
20 bis unter 25	3,22%		3,28%	
25 bis unter 30	6,91%		7,35%	
30 bis unter 35	7,36%		8,26%	
35 bis unter 40	3,89%		4,46%	
40 bis unter 45	0,78%		0,89%	
45 bis unter 50	0,06%		0,07%	
50 bis unter 55	0,02%		0,02%	
55 bis unter 60	0,01%		0,01%	
60 bis unter 65	0,01%		0,01%	
65 bis unter 70	0,00%		0,00%	
70 bis unter 75	0,00%		0,00%	
75 bis unter 80	0,00%		0,03%	
80 und älter	0,00%		0,00%	
Zusammen	1,74%		1,92%	
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben				
bis unter 15	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%
15 bis unter 20	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
20 bis unter 25	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
25 bis unter 30	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%
30 bis unter 35	0,03%	0,01%	0,03%	0,00%
35 bis unter 40	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%
40 bis unter 45	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
45 bis unter 50	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
50 bis unter 55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
55 bis unter 60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60 bis unter 65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
65 bis unter 70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70 bis unter 75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75 bis unter 80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80 und älter	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zusammen	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien				
bis unter 15	0,00%	6,92%	6,85%	6,14%
15 bis unter 20	0,29%	0,30%	0,33%	0,30%
20 bis unter 25	0,38%	0,27%	0,39%	0,30%
25 bis unter 30	0,37%	0,24%	0,34%	0,25%
30 bis unter 35	0,28%	0,23%	0,26%	0,22%
35 bis unter 40	0,24%	0,19%	0,24%	0,20%
40 bis unter 45	0,21%	0,18%	0,23%	0,19%
45 bis unter 50	0,21%	0,16%	0,20%	0,18%
50 bis unter 55	0,19%	0,15%	0,20%	0,16%
55 bis unter 60	0,17%	0,13%	0,19%	0,13%
60 bis unter 65	0,19%	0,13%	0,16%	0,13%
65 bis unter 70	0,06%	0,11%	0,12%	0,10%
70 bis unter 75	0,02%	0,14%	0,22%	0,35%
75 bis unter 80	0,17%	0,15%	0,00%	0,01%
80 und älter	0,16%	0,20%	0,00%	0,00%
Zusammen	0,23%	0,18%	0,23%	0,18%
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	9,85%	24,82%	13,69%	6,58%
15 bis unter 20	7,64%	5,47%	8,20%	5,75%
20 bis unter 25	6,66%	4,67%	6,96%	4,96%
25 bis unter 30	6,13%	4,25%	6,45%	4,33%
30 bis unter 35	5,77%	3,87%	6,07%	4,14%
35 bis unter 40	5,41%	4,05%	5,66%	4,15%
40 bis unter 45	4,91%	3,97%	5,09%	4,03%
45 bis unter 50	4,47%	4,00%	4,77%	4,00%
50 bis unter 55	4,17%	4,03%	4,42%	4,01%
55 bis unter 60	4,11%	4,02%	4,19%	4,07%
60 bis unter 65	4,09%	3,99%	4,05%	3,97%
65 bis unter 70	5,13%	5,14%	4,32%	3,90%
70 bis unter 75	5,19%	7,80%	5,51%	6,86%
75 bis unter 80	5,89%	8,78%	7,69%	8,93%
80 und älter	12,17%	14,47%	17,19%	15,58%
Zusammen	4,87%	4,10%	5,07%	4,16%

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	7,83%	5,25%	4,65%	18,86%
15 bis unter 20	8,97%	22,43%	8,92%	22,56%
20 bis unter 25	7,98%	20,56%	8,04%	20,34%
25 bis unter 30	6,73%	17,17%	6,72%	17,03%
30 bis unter 35	5,99%	12,89%	5,77%	13,53%
35 bis unter 40	6,27%	11,50%	5,94%	11,31%
40 bis unter 45	6,74%	10,63%	6,53%	10,58%
45 bis unter 50	6,77%	10,03%	6,79%	9,82%
50 bis unter 55	7,17%	8,91%	7,07%	8,72%
55 bis unter 60	7,77%	7,27%	7,48%	7,28%
60 bis unter 65	7,79%	6,21%	7,32%	6,10%
65 bis unter 70	9,64%	7,33%	8,52%	6,54%
70 bis unter 75	15,49%	11,62%	18,05%	12,08%
75 bis unter 80	21,19%	9,58%	15,90%	12,29%
80 und älter	17,96%	9,29%	20,00%	11,10%
Zusammen	7,09%	10,86%	6,93%	10,73%

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	2,7%	3,3%	8,1%	5,4%
15 bis unter 20	11,9%	11,9%	12,3%	12,3%
20 bis unter 25	9,2%	9,6%	9,4%	9,8%
25 bis unter 30	6,8%	7,7%	7,1%	7,8%
30 bis unter 35	5,7%	6,7%	5,9%	6,9%
35 bis unter 40	5,0%	5,8%	5,1%	5,8%
40 bis unter 45	4,3%	4,7%	4,4%	4,8%
45 bis unter 50	3,8%	4,0%	3,7%	3,9%
50 bis unter 55	3,4%	3,5%	3,4%	3,3%
55 bis unter 60	3,2%	2,9%	3,2%	2,8%
60 bis unter 65	2,7%	2,4%	2,7%	2,3%
65 bis unter 70	2,5%	2,0%	2,5%	2,2%
70 bis unter 75	2,5%	2,7%	3,2%	3,8%
75 bis unter 80	4,1%	2,8%	3,4%	2,4%
80 und älter	3,1%	3,6%	6,1%	5,5%
Zusammen	4,4%	4,7%	4,4%	4,6%
II. Neubildungen				
bis unter 15	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%
15 bis unter 20	0,4%	0,6%	0,5%	0,6%
20 bis unter 25	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%
25 bis unter 30	1,3%	1,2%	1,4%	1,1%
30 bis unter 35	2,0%	1,4%	2,2%	1,4%
35 bis unter 40	3,1%	1,6%	3,3%	1,6%
40 bis unter 45	4,8%	2,0%	4,8%	2,1%
45 bis unter 50	6,1%	2,8%	6,2%	2,8%
50 bis unter 55	6,9%	4,1%	7,1%	4,1%
55 bis unter 60	6,7%	5,7%	6,8%	5,6%
60 bis unter 65	7,4%	7,0%	7,4%	7,1%
65 bis unter 70	10,2%	10,4%	11,0%	10,0%
70 bis unter 75	7,9%	12,3%	9,2%	11,3%
75 bis unter 80	5,9%	13,7%	9,3%	13,7%
80 und älter	7,0%	8,5%	11,2%	12,8%
Zusammen	5,1%	3,5%	5,2%	3,6%

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%
15 bis unter 20	0,14%	0,09%	0,13%	0,06%
20 bis unter 25	0,16%	0,10%	0,17%	0,11%
25 bis unter 30	0,18%	0,13%	0,17%	0,13%
30 bis unter 35	0,21%	0,15%	0,20%	0,14%
35 bis unter 40	0,23%	0,16%	0,22%	0,16%
40 bis unter 45	0,24%	0,18%	0,24%	0,14%
45 bis unter 50	0,24%	0,17%	0,24%	0,16%
50 bis unter 55	0,21%	0,19%	0,20%	0,17%
55 bis unter 60	0,18%	0,19%	0,17%	0,19%
60 bis unter 65	0,19%	0,21%	0,18%	0,20%
65 bis unter 70	0,32%	0,25%	0,25%	0,28%
70 bis unter 75	0,20%	0,31%	0,35%	0,14%
75 bis unter 80	0,50%	0,41%	0,09%	1,03%
80 und älter	0,61%	1,00%	0,31%	0,16%
Zusammen	0,21%	0,17%	0,20%	0,16%
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	0,00%	5,26%	0,06%	0,00%
15 bis unter 20	0,33%	0,24%	0,36%	0,23%
20 bis unter 25	0,49%	0,31%	0,47%	0,29%
25 bis unter 30	0,62%	0,32%	0,60%	0,36%
30 bis unter 35	0,70%	0,44%	0,72%	0,45%
35 bis unter 40	0,83%	0,58%	0,78%	0,53%
40 bis unter 45	0,87%	0,69%	0,83%	0,67%
45 bis unter 50	0,84%	0,86%	0,87%	0,85%
50 bis unter 55	0,84%	1,06%	0,84%	0,94%
55 bis unter 60	0,86%	1,13%	0,78%	1,09%
60 bis unter 65	0,83%	1,20%	0,75%	1,10%
65 bis unter 70	0,99%	1,27%	0,84%	1,27%
70 bis unter 75	1,20%	1,23%	0,69%	0,57%
75 bis unter 80	1,30%	1,64%	3,27%	2,01%
80 und älter	6,62%	2,22%	0,80%	0,68%
Zusammen	0,79%	0,83%	0,76%	0,79%

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	1,03%	20,07%	7,66%	5,55%
15 bis unter 20	11,33%	5,98%	11,90%	6,18%
20 bis unter 25	17,59%	10,78%	17,67%	11,11%
25 bis unter 30	20,83%	13,79%	20,40%	14,06%
30 bis unter 35	23,32%	15,70%	23,01%	15,75%
35 bis unter 40	24,00%	16,03%	24,17%	16,41%
40 bis unter 45	23,19%	15,37%	23,72%	15,70%
45 bis unter 50	21,74%	14,63%	22,16%	15,12%
50 bis unter 55	20,26%	13,20%	20,79%	13,93%
55 bis unter 60	19,90%	12,06%	20,22%	12,51%
60 bis unter 65	20,28%	11,76%	20,57%	12,15%
65 bis unter 70	16,76%	9,63%	17,48%	10,81%
70 bis unter 75	4,76%	2,05%	3,72%	2,68%
75 bis unter 80	4,94%	1,89%	6,64%	1,29%
80 und älter	4,80%	1,89%	2,20%	3,15%
Zusammen	21,02%	13,40%	21,27%	13,82%
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%
15 bis unter 20	2,15%	1,36%	2,07%	1,42%
20 bis unter 25	2,70%	1,78%	2,68%	1,77%
25 bis unter 30	2,65%	2,04%	2,77%	2,10%
30 bis unter 35	2,72%	2,22%	2,84%	2,26%
35 bis unter 40	2,99%	2,45%	3,10%	2,50%
40 bis unter 45	3,22%	2,68%	3,22%	2,74%
45 bis unter 50	3,18%	2,85%	3,33%	2,73%
50 bis unter 55	3,27%	2,84%	3,29%	2,82%
55 bis unter 60	2,83%	2,80%	2,92%	2,82%
60 bis unter 65	2,48%	2,84%	2,46%	2,74%
65 bis unter 70	2,41%	2,85%	2,44%	2,79%
70 bis unter 75	2,49%	2,35%	1,83%	2,55%
75 bis unter 80	2,51%	3,22%	1,62%	2,02%
80 und älter	2,76%	3,72%	2,20%	2,25%
Zusammen	2,93%	2,59%	2,99%	2,59%

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	4,11%	0,66%	0,58%	0,00%
15 bis unter 20	0,51%	0,45%	0,47%	0,44%
20 bis unter 25	0,49%	0,48%	0,54%	0,46%
25 bis unter 30	0,54%	0,54%	0,52%	0,56%
30 bis unter 35	0,52%	0,59%	0,49%	0,62%
35 bis unter 40	0,52%	0,65%	0,51%	0,64%
40 bis unter 45	0,51%	0,69%	0,50%	0,64%
45 bis unter 50	0,59%	0,74%	0,58%	0,74%
50 bis unter 55	0,70%	0,87%	0,67%	0,86%
55 bis unter 60	0,89%	1,04%	0,88%	1,00%
60 bis unter 65	1,09%	1,15%	1,08%	1,12%
65 bis unter 70	1,43%	1,14%	1,21%	1,16%
70 bis unter 75	2,81%	2,13%	2,95%	1,63%
75 bis unter 80	2,95%	2,04%	3,33%	2,84%
80 und älter	1,69%	1,31%	5,20%	1,72%
Zusammen	0,69%	0,80%	0,68%	0,80%
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	0,00%	0,66%	0,40%	0,00%
15 bis unter 20	1,03%	0,85%	1,00%	0,83%
20 bis unter 25	0,94%	0,74%	0,93%	0,70%
25 bis unter 30	0,92%	0,78%	0,93%	0,75%
30 bis unter 35	0,94%	0,89%	0,93%	0,88%
35 bis unter 40	1,00%	0,93%	0,98%	0,91%
40 bis unter 45	0,98%	0,92%	0,97%	0,88%
45 bis unter 50	0,94%	0,90%	0,97%	0,88%
50 bis unter 55	0,91%	0,89%	0,92%	0,85%
55 bis unter 60	0,90%	0,84%	0,90%	0,81%
60 bis unter 65	0,84%	0,75%	0,81%	0,73%
65 bis unter 70	0,51%	0,60%	0,58%	0,53%
70 bis unter 75	1,41%	0,38%	1,56%	0,85%
75 bis unter 80	1,06%	0,38%	0,92%	0,82%
80 und älter	1,73%	0,45%	3,00%	0,05%
Zusammen	0,92%	0,85%	0,92%	0,82%

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	0,00%	0,00%	1,75%	5,22%
15 bis unter 20	1,30%	1,05%	1,23%	1,00%
20 bis unter 25	1,35%	1,15%	1,34%	1,15%
25 bis unter 30	1,59%	1,48%	1,55%	1,41%
30 bis unter 35	1,73%	1,86%	1,72%	1,84%
35 bis unter 40	2,03%	2,49%	2,09%	2,56%
40 bis unter 45	2,59%	3,61%	2,55%	3,71%
45 bis unter 50	3,19%	5,28%	3,24%	5,26%
50 bis unter 55	3,66%	7,36%	3,67%	7,33%
55 bis unter 60	4,33%	9,65%	4,33%	9,49%
60 bis unter 65	5,57%	11,44%	5,46%	11,40%
65 bis unter 70	7,20%	13,79%	7,33%	13,41%
70 bis unter 75	9,10%	18,66%	8,33%	15,61%
75 bis unter 80	16,05%	19,33%	12,25%	12,25%
80 und älter	14,48%	24,18%	12,20%	10,71%
Zusammen	3,21%	5,92%	3,25%	5,97%
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	26,37%	19,57%	26,21%	26,25%
15 bis unter 20	29,80%	27,98%	28,49%	26,47%
20 bis unter 25	24,32%	22,16%	23,72%	21,24%
25 bis unter 30	21,66%	20,24%	21,30%	19,52%
30 bis unter 35	20,11%	20,21%	19,62%	19,19%
35 bis unter 40	18,86%	18,77%	17,94%	17,29%
40 bis unter 45	16,97%	16,55%	15,62%	14,81%
45 bis unter 50	15,27%	14,47%	13,68%	12,78%
50 bis unter 55	14,10%	12,92%	12,61%	11,30%
55 bis unter 60	13,67%	11,57%	12,33%	10,22%
60 bis unter 65	11,56%	9,60%	10,79%	8,77%
65 bis unter 70	9,85%	8,36%	9,50%	7,89%
70 bis unter 75	12,05%	9,43%	14,13%	11,72%
75 bis unter 80	9,77%	6,92%	10,27%	7,08%
80 und älter	3,91%	6,91%	15,73%	11,02%
Zusammen	16,41%	15,21%	15,18%	13,79%

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	0,34%	1,97%	6,90%	5,25%
15 bis unter 20	9,56%	8,33%	9,26%	8,07%
20 bis unter 25	7,94%	7,76%	7,54%	7,38%
25 bis unter 30	5,93%	7,10%	5,83%	6,78%
30 bis unter 35	4,98%	6,65%	4,83%	6,37%
35 bis unter 40	4,63%	6,27%	4,63%	6,13%
40 bis unter 45	4,50%	6,07%	4,46%	5,90%
45 bis unter 50	4,42%	6,03%	4,32%	5,77%
50 bis unter 55	4,19%	5,86%	4,13%	5,59%
55 bis unter 60	4,08%	5,23%	3,96%	5,04%
60 bis unter 65	3,57%	4,38%	3,54%	4,27%
65 bis unter 70	2,93%	4,12%	3,11%	3,90%
70 bis unter 75	3,01%	5,74%	3,24%	5,03%
75 bis unter 80	4,74%	4,99%	3,49%	4,87%
80 und älter	5,12%	5,35%	7,62%	4,54%
Zusammen	4,67%	5,95%	4,55%	5,70%
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	10,62%	0,00%	1,44%	5,22%
15 bis unter 20	1,99%	3,24%	1,96%	3,22%
20 bis unter 25	1,70%	3,08%	1,67%	3,05%
25 bis unter 30	1,32%	2,67%	1,37%	2,64%
30 bis unter 35	1,10%	2,11%	1,12%	2,11%
35 bis unter 40	1,00%	1,80%	1,04%	1,75%
40 bis unter 45	1,03%	1,64%	1,04%	1,64%
45 bis unter 50	1,06%	1,54%	1,06%	1,50%
50 bis unter 55	1,01%	1,43%	1,01%	1,41%
55 bis unter 60	0,95%	1,31%	0,97%	1,31%
60 bis unter 65	0,85%	1,14%	0,89%	1,14%
65 bis unter 70	0,70%	0,91%	0,72%	1,03%
70 bis unter 75	0,94%	1,31%	1,90%	0,68%
75 bis unter 80	0,61%	2,78%	0,76%	4,69%
80 und älter	0,43%	0,83%	1,08%	2,03%
Zusammen	1,07%	1,71%	1,08%	1,68%

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	26,37%	7,73%	18,99%	15,75%
15 bis unter 20	8,43%	10,14%	8,48%	9,79%
20 bis unter 25	11,28%	15,37%	11,19%	15,01%
25 bis unter 30	12,63%	19,74%	12,75%	19,21%
30 bis unter 35	13,83%	22,38%	13,95%	21,92%
35 bis unter 40	17,49%	25,94%	17,33%	25,26%
40 bis unter 45	21,99%	29,10%	21,92%	28,79%
45 bis unter 50	24,63%	30,81%	25,04%	30,69%
50 bis unter 55	26,90%	31,91%	27,06%	31,87%
55 bis unter 60	28,07%	32,68%	28,25%	32,75%
60 bis unter 65	29,84%	34,39%	29,91%	34,26%
65 bis unter 70	29,23%	31,29%	28,27%	30,75%
70 bis unter 75	23,53%	18,36%	22,10%	19,70%
75 bis unter 80	21,17%	16,97%	15,51%	21,00%
80 und älter	13,64%	10,51%	6,56%	9,63%
Zusammen	22,61%	28,44%	22,87%	28,35%
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	0,68%	0,66%	3,70%	0,00%
15 bis unter 20	3,21%	0,61%	3,09%	0,62%
20 bis unter 25	2,82%	0,76%	2,69%	0,73%
25 bis unter 30	2,82%	0,87%	2,74%	0,85%
30 bis unter 35	2,85%	0,94%	2,76%	0,93%
35 bis unter 40	2,74%	1,04%	2,63%	0,98%
40 bis unter 45	2,60%	1,10%	2,58%	1,11%
45 bis unter 50	2,49%	1,18%	2,44%	1,14%
50 bis unter 55	2,10%	1,26%	2,03%	1,25%
55 bis unter 60	1,67%	1,41%	1,65%	1,34%
60 bis unter 65	1,52%	1,41%	1,48%	1,37%
65 bis unter 70	1,58%	1,68%	1,42%	1,73%
70 bis unter 75	2,30%	3,41%	2,29%	2,60%
75 bis unter 80	4,01%	3,13%	2,50%	2,42%
80 und älter	1,65%	4,82%	1,11%	1,96%
Zusammen	2,29%	1,17%	2,22%	1,14%

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett				
bis unter 15	0,00%		5,71%	
15 bis unter 20	0,97%		0,87%	
20 bis unter 25	3,04%		2,84%	
25 bis unter 30	6,80%		6,47%	
30 bis unter 35	7,26%		7,05%	
35 bis unter 40	3,90%		3,88%	
40 bis unter 45	0,81%		0,90%	
45 bis unter 50	0,07%		0,07%	
50 bis unter 55	0,03%		0,02%	
55 bis unter 60	0,02%		0,02%	
60 bis unter 65	0,01%		0,01%	
65 bis unter 70	0,02%		0,04%	
70 bis unter 75	0,01%		0,00%	
75 bis unter 80	0,00%		0,00%	
80 und älter	0,00%		0,00%	
Zusammen	1,69%		1,62%	
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben				
bis unter 15	5,48%	0,00%	0,00%	0,00%
15 bis unter 20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20 bis unter 25	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
25 bis unter 30	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%
30 bis unter 35	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%
35 bis unter 40	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%
40 bis unter 45	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
45 bis unter 50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50 bis unter 55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
55 bis unter 60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60 bis unter 65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
65 bis unter 70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70 bis unter 75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75 bis unter 80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80 und älter	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zusammen	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien				
bis unter 15	16,10%	18,59%	0,30%	0,00%
15 bis unter 20	0,33%	0,26%	0,32%	0,23%
20 bis unter 25	0,38%	0,28%	0,42%	0,24%
25 bis unter 30	0,36%	0,27%	0,38%	0,26%
30 bis unter 35	0,30%	0,24%	0,29%	0,22%
35 bis unter 40	0,27%	0,18%	0,31%	0,20%
40 bis unter 45	0,23%	0,17%	0,25%	0,17%
45 bis unter 50	0,22%	0,17%	0,21%	0,17%
50 bis unter 55	0,20%	0,16%	0,20%	0,14%
55 bis unter 60	0,17%	0,13%	0,18%	0,14%
60 bis unter 65	0,15%	0,13%	0,14%	0,12%
65 bis unter 70	0,11%	0,05%	0,16%	0,12%
70 bis unter 75	0,55%	0,11%	0,65%	0,04%
75 bis unter 80	0,00%	0,03%	0,12%	0,23%
80 und älter	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
Zusammen	0,23%	0,18%	0,24%	0,17%
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	5,82%	11,68%	5,65%	5,25%
15 bis unter 20	7,95%	5,69%	8,05%	5,68%
20 bis unter 25	6,87%	4,97%	7,02%	5,06%
25 bis unter 30	6,26%	4,30%	6,39%	4,42%
30 bis unter 35	5,93%	4,15%	6,06%	4,16%
35 bis unter 40	5,53%	4,14%	5,62%	4,21%
40 bis unter 45	4,97%	4,04%	5,17%	4,14%
45 bis unter 50	4,62%	4,03%	4,74%	4,13%
50 bis unter 55	4,32%	4,08%	4,44%	4,07%
55 bis unter 60	4,17%	4,15%	4,35%	4,19%
60 bis unter 65	3,97%	4,11%	4,21%	4,22%
65 bis unter 70	4,61%	4,82%	4,50%	4,57%
70 bis unter 75	6,59%	6,99%	3,33%	5,13%
75 bis unter 80	6,33%	8,38%	10,83%	5,44%
80 und älter	11,83%	13,45%	3,81%	9,33%
Zusammen	4,93%	4,20%	5,06%	4,25%

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	0,34%	9,87%	7,92%	26,11%
15 bis unter 20	8,65%	21,21%	9,46%	22,91%
20 bis unter 25	7,95%	19,78%	8,86%	21,06%
25 bis unter 30	6,74%	16,80%	7,38%	17,98%
30 bis unter 35	5,79%	13,35%	6,30%	14,84%
35 bis unter 40	5,86%	11,18%	6,35%	13,09%
40 bis unter 45	6,25%	10,41%	6,83%	12,15%
45 bis unter 50	6,55%	9,53%	7,08%	11,30%
50 bis unter 55	6,95%	8,46%	7,60%	10,05%
55 bis unter 60	7,40%	7,23%	8,10%	8,72%
60 bis unter 65	7,12%	6,11%	7,67%	7,09%
65 bis unter 70	8,60%	6,88%	8,65%	7,55%
70 bis unter 75	18,61%	12,63%	20,59%	15,97%
75 bis unter 80	14,01%	11,35%	15,65%	15,97%
80 und älter	20,71%	11,19%	20,80%	24,44%
Zusammen	6,80%	10,38%	7,42%	11,79%

Anlage 2

Die Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Pflichtmitglieder nach Alter und Geschlecht:

Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten		
bis unter 15	3,4	1,0
15 bis unter 20	97,8	78,4
20 bis unter 25	59,3	55,7
25 bis unter 30	34,8	35,0
30 bis unter 35	33,7	34,0
35 bis unter 40	37,9	36,3
40 bis unter 45	39,8	35,5
45 bis unter 50	41,6	35,5
50 bis unter 55	47,5	36,3
55 bis unter 60	50,0	39,5
60 bis unter 65	41,0	36,2
65 bis unter 70	17,6	20,3
70 bis unter 75	7,6	5,9
75 bis unter 80	7,4	6,9
80 und älter	7,8	6,1
Zusammen	43,3	38,7
II. Neubildungen		
bis unter 15	0,7	1,4
15 bis unter 20	5,3	5,1
20 bis unter 25	7,2	7,3
25 bis unter 30	8,5	6,9
30 bis unter 35	15,9	9,2
35 bis unter 40	35,0	11,9
40 bis unter 45	62,4	17,8
45 bis unter 50	97,7	28,2
50 bis unter 55	120,6	51,0
55 bis unter 60	141,1	85,6
60 bis unter 65	160,9	117,7
65 bis unter 70	105,4	85,0
70 bis unter 75	30,4	37,0
75 bis unter 80	24,6	38,5
80 und älter	23,5	41,8
Zusammen	64,6	29,4

Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems		
bis unter 15	0,0	0,0
15 bis unter 20	1,6	0,6
20 bis unter 25	1,2	0,9
25 bis unter 30	1,1	0,7
30 bis unter 35	1,8	1,1
35 bis unter 40	2,5	1,1
40 bis unter 45	2,9	1,4
45 bis unter 50	3,6	1,7
50 bis unter 55	4,0	2,2
55 bis unter 60	3,9	3,5
60 bis unter 65	3,4	5,1
65 bis unter 70	1,4	5,5
70 bis unter 75	0,5	2,0
75 bis unter 80	5,7	3,3
80 und älter	7,1	5,7
Zusammen	2,7	1,7
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten		
bis unter 15	0,0	3,8
15 bis unter 20	3,1	2,1
20 bis unter 25	3,3	2,1
25 bis unter 30	3,7	2,0
30 bis unter 35	5,6	2,8
35 bis unter 40	8,3	4,2
40 bis unter 45	10,9	6,8
45 bis unter 50	13,8	10,0
50 bis unter 55	16,9	15,2
55 bis unter 60	21,2	22,0
60 bis unter 65	19,6	24,4
65 bis unter 70	13,6	12,0
70 bis unter 75	8,9	7,4
75 bis unter 80	21,2	11,6
80 und älter	15,9	17,5
Zusammen	10,7	8,4

Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
V. Psychische und Verhaltensstörungen		
bis unter 15	21,8	32,2
15 bis unter 20	68,8	29,7
20 bis unter 25	95,2	50,5
25 bis unter 30	94,1	57,3
30 bis unter 35	123,7	67,2
35 bis unter 40	159,8	83,4
40 bis unter 45	184,0	93,3
45 bis unter 50	204,5	102,0
50 bis unter 55	238,4	115,9
55 bis unter 60	276,6	133,2
60 bis unter 65	215,2	118,2
65 bis unter 70	91,5	49,1
70 bis unter 75	9,5	9,0
75 bis unter 80	7,6	11,9
80 und älter	23,3	15,5
Zusammen	172,0	87,0
VI. Krankheiten des Nervensystems		
bis unter 15	0,7	0,0
15 bis unter 20	18,2	10,6
20 bis unter 25	17,1	11,9
25 bis unter 30	15,4	11,0
30 bis unter 35	19,9	13,5
35 bis unter 40	27,5	18,7
40 bis unter 45	36,1	22,9
45 bis unter 50	43,7	26,7
50 bis unter 55	51,0	33,8
55 bis unter 60	54,7	41,4
60 bis unter 65	41,5	43,3
65 bis unter 70	19,7	24,7
70 bis unter 75	6,9	8,3
75 bis unter 80	7,3	9,7
80 und älter	3,4	10,5
Zusammen	33,4	22,8

Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde		
bis unter 15	0,0	0,0
15 bis unter 20	5,0	4,3
20 bis unter 25	3,9	3,6
25 bis unter 30	3,3	3,0
30 bis unter 35	3,9	3,6
35 bis unter 40	4,7	4,5
40 bis unter 45	5,8	5,8
45 bis unter 50	7,2	7,2
50 bis unter 55	11,0	10,7
55 bis unter 60	15,4	15,8
60 bis unter 65	17,4	18,7
65 bis unter 70	10,7	12,9
70 bis unter 75	7,0	6,2
75 bis unter 80	5,4	5,3
80 und älter	4,9	8,8
Zusammen	7,2	7,0
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes		
bis unter 15	0,0	0,2
15 bis unter 20	10,1	7,7
20 bis unter 25	7,7	6,1
25 bis unter 30	5,8	4,6
30 bis unter 35	6,9	5,6
35 bis unter 40	9,1	7,0
40 bis unter 45	10,9	8,2
45 bis unter 50	12,3	9,5
50 bis unter 55	15,5	10,9
55 bis unter 60	17,1	13,3
60 bis unter 65	13,1	12,9
65 bis unter 70	6,5	5,8
70 bis unter 75	1,9	1,6
75 bis unter 80	1,1	1,3
80 und älter	0,0	1,5
Zusammen	10,7	8,2

Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems		
bis unter 15	2,2	0,0
15 bis unter 20	15,9	10,2
20 bis unter 25	13,6	10,6
25 bis unter 30	11,7	10,1
30 bis unter 35	15,3	14,0
35 bis unter 40	23,5	23,4
40 bis unter 45	34,2	39,6
45 bis unter 50	51,3	67,4
50 bis unter 55	74,7	114,0
55 bis unter 60	106,5	180,1
60 bis unter 65	122,0	221,4
65 bis unter 70	82,4	156,9
70 bis unter 75	50,5	72,9
75 bis unter 80	86,4	73,9
80 und älter	74,9	98,3
Zusammen	43,5	60,9
X. Krankheiten des Atmungssystems		
bis unter 15	6,5	9,9
15 bis unter 20	309,2	241,4
20 bis unter 25	192,4	168,0
25 bis unter 30	130,3	111,1
30 bis unter 35	141,0	118,3
35 bis unter 40	157,6	129,4
40 bis unter 45	165,8	129,0
45 bis unter 50	171,9	129,6
50 bis unter 55	195,2	139,5
55 bis unter 60	210,0	156,2
60 bis unter 65	164,9	147,9
65 bis unter 70	77,9	74,7
70 bis unter 75	28,8	23,6
75 bis unter 80	18,4	31,5
80 und älter	13,5	18,5
Zusammen	171,0	136,2

Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XI. Krankheiten des Verdauungssystems		
bis unter 15	0,7	0,6
15 bis unter 20	143,8	102,3
20 bis unter 25	89,1	82,3
25 bis unter 30	49,6	52,7
30 bis unter 35	46,7	51,6
35 bis unter 40	53,0	58,5
40 bis unter 45	60,5	64,8
45 bis unter 50	69,4	73,4
50 bis unter 55	79,4	84,2
55 bis unter 60	89,1	97,9
60 bis unter 65	73,1	89,9
65 bis unter 70	41,1	51,4
70 bis unter 75	15,4	23,0
75 bis unter 80	16,5	27,1
80 und älter	27,2	17,1
Zusammen	67,6	70,9
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut		
bis unter 15	0,0	0,0
15 bis unter 20	20,3	29,3
20 bis unter 25	14,1	24,0
25 bis unter 30	8,5	15,6
30 bis unter 35	8,7	13,8
35 bis unter 40	10,8	14,6
40 bis unter 45	13,1	16,2
45 bis unter 50	14,3	17,3
50 bis unter 55	16,7	19,3
55 bis unter 60	19,6	22,8
60 bis unter 65	15,5	19,1
65 bis unter 70	7,9	9,9
70 bis unter 75	3,2	4,1
75 bis unter 80	1,1	6,2
80 und älter	6,2	2,6
Zusammen	13,3	17,9

Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes		
bis unter 15	0,0	1,4
15 bis unter 20	96,8	94,5
20 bis unter 25	91,1	118,7
25 bis unter 30	81,3	114,3
30 bis unter 35	111,1	153,3
35 bis unter 40	174,8	223,5
40 bis unter 45	247,7	278,3
45 bis unter 50	333,4	347,3
50 bis unter 55	450,9	425,3
55 bis unter 60	582,4	559,7
60 bis unter 65	561,7	650,7
65 bis unter 70	277,1	336,0
70 bis unter 75	61,9	43,7
75 bis unter 80	43,4	48,6
80 und älter	45,9	52,0
Zusammen	266,4	284,8
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems		
bis unter 15	7,7	0,6
15 bis unter 20	40,3	6,6
20 bis unter 25	28,6	6,8
25 bis unter 30	21,0	5,6
30 bis unter 35	24,8	7,0
35 bis unter 40	30,9	8,6
40 bis unter 45	38,3	10,2
45 bis unter 50	44,9	13,5
50 bis unter 55	47,9	17,5
55 bis unter 60	44,1	24,6
60 bis unter 65	36,4	28,2
65 bis unter 70	19,2	17,5
70 bis unter 75	7,2	14,1
75 bis unter 80	9,8	14,6
80 und älter	8,1	14,5
Zusammen	35,4	12,0

Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett		
bis unter 15	0,0	
15 bis unter 20	14,4	
20 bis unter 25	32,2	
25 bis unter 30	50,7	
30 bis unter 35	57,2	
35 bis unter 40	33,1	
40 bis unter 45	8,1	
45 bis unter 50	0,9	
50 bis unter 55	0,3	
55 bis unter 60	0,2	
60 bis unter 65	0,3	
65 bis unter 70	0,0	
70 bis unter 75	0,1	
75 bis unter 80	0,0	
80 und älter	0,0	
Zusammen	20,9	
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben		
bis unter 15	6,7	29,2
15 bis unter 20	0,1	0,1
20 bis unter 25	0,1	0,0
25 bis unter 30	0,2	0,0
30 bis unter 35	0,2	0,0
35 bis unter 40	0,2	0,0
40 bis unter 45	0,1	0,0
45 bis unter 50	0,0	0,0
50 bis unter 55	0,0	0,0
55 bis unter 60	0,0	0,0
60 bis unter 65	0,0	0,1
65 bis unter 70	0,0	0,0
70 bis unter 75	0,0	0,0
75 bis unter 80	0,0	0,0
80 und älter	0,0	0,0
Zusammen	0,1	0,0

Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien		
bis unter 15	0,5	3,2
15 bis unter 20	3,5	2,6
20 bis unter 25	3,3	2,2
25 bis unter 30	2,3	1,6
30 bis unter 35	2,2	1,5
35 bis unter 40	2,5	1,8
40 bis unter 45	2,6	1,5
45 bis unter 50	3,0	1,8
50 bis unter 55	3,1	1,8
55 bis unter 60	3,4	2,4
60 bis unter 65	3,7	1,9
65 bis unter 70	0,7	2,4
70 bis unter 75	0,0	0,3
75 bis unter 80	0,0	0,8
80 und älter	0,0	0,3
Zusammen	2,8	1,8
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind		
bis unter 15	8,2	2,2
15 bis unter 20	75,6	40,5
20 bis unter 25	50,5	31,7
25 bis unter 30	35,4	22,4
30 bis unter 35	39,3	24,2
35 bis unter 40	45,5	29,8
40 bis unter 45	49,8	35,9
45 bis unter 50	58,6	43,9
50 bis unter 55	68,2	56,1
55 bis unter 60	79,8	74,7
60 bis unter 65	74,7	78,7
65 bis unter 70	40,8	56,7
70 bis unter 75	20,2	26,7
75 bis unter 80	33,0	31,8
80 und älter	50,0	60,5
Zusammen	54,1	40,7

Altersgruppe	2008	
	Frauen	Männer
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen		
bis unter 15	6,7	7,2
15 bis unter 20	100,2	245,8
20 bis unter 25	67,7	181,3
25 bis unter 30	44,7	112,3
30 bis unter 35	46,1	96,6
35 bis unter 40	62,1	106,0
40 bis unter 45	77,4	109,9
45 bis unter 50	87,5	115,8
50 bis unter 55	111,9	118,8
55 bis unter 60	140,4	122,6
60 bis unter 65	131,0	113,6
65 bis unter 70	97,0	74,6
70 bis unter 75	46,5	30,9
75 bis unter 80	45,3	28,7
80 und älter	89,9	49,5
Zusammen	81,3	121,2

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	0,3	1,0	0,5	0,1
15 bis unter 20	193,1	168,7	188,1	165,5
20 bis unter 25	100,6	100,2	98,2	96,5
25 bis unter 30	61,4	62,6	58,5	59,6
30 bis unter 35	60,2	63,3	55,5	58,9
35 bis unter 40	60,4	63,1	55,5	57,5
40 bis unter 45	62,6	62,4	55,5	55,5
45 bis unter 50	62,3	58,9	55,1	52,0
50 bis unter 55	66,0	57,6	56,9	50,3
55 bis unter 60	69,6	59,7	60,7	51,5
60 bis unter 65	57,3	49,1	51,8	45,2
65 bis unter 70	20,7	16,0	18,5	15,8
70 bis unter 75	7,7	3,6	4,5	3,7
75 bis unter 80	3,0	2,7	3,6	1,9
80 und älter	2,2	3,8	1,9	2,7
Zusammen	67,4	65,4	61,2	59,7
II. Neubildungen				
bis unter 15				
15 bis unter 20	0,0	0,0	0,0	0,0
20 bis unter 25	9,7	8,1	8,4	7,4
25 bis unter 30	9,4	8,7	8,5	7,9
30 bis unter 35	11,1	8,6	11,0	8,6
35 bis unter 40	18,9	11,7	19,2	11,4
40 bis unter 45	32,6	15,6	34,6	15,2
45 bis unter 50	61,7	22,4	62,1	23,9
50 bis unter 55	89,5	35,6	89,9	35,5
55 bis unter 60	118,5	59,9	118,3	61,6
60 bis unter 65	134,1	103,5	134,8	103,5
65 bis unter 70	143,3	126,3	142,4	136,7
70 bis unter 75	90,4	67,5	93,6	80,2
75 bis unter 80	14,6	14,2	15,0	15,1
80 und älter	6,6	18,3	10,6	10,6
Zusammen	2,6	14,4	4,7	10,7

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,0	0,0	0,0	0,0
15 bis unter 20	2,9	1,2	2,5	1,1
20 bis unter 25	1,9	0,9	1,9	0,8
25 bis unter 30	1,7	1,0	1,7	1,0
30 bis unter 35	2,2	1,4	2,0	1,4
35 bis unter 40	2,8	1,4	2,5	1,6
40 bis unter 45	3,4	1,7	3,7	1,9
45 bis unter 50	3,7	2,2	4,0	2,0
50 bis unter 55	4,0	2,6	3,5	2,7
55 bis unter 60	3,4	3,2	3,4	3,6
60 bis unter 65	3,7	4,2	4,2	4,3
65 bis unter 70	2,1	1,4	2,0	2,0
70 bis unter 75	0,6	0,6	0,5	0,5
75 bis unter 80	0,6	1,1	0,6	0,9
80 und älter	0,4	1,1	0,1	0,4
Zusammen	3,0	1,9	3,0	2,0
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	0,0	0,0	0,0	0,0
15 bis unter 20	6,5	3,8	6,6	3,6
20 bis unter 25	5,2	3,3	5,2	3,2
25 bis unter 30	5,0	3,0	5,3	3,0
30 bis unter 35	7,2	3,9	7,1	3,9
35 bis unter 40	9,2	6,1	8,8	5,7
40 bis unter 45	11,7	9,2	11,9	8,7
45 bis unter 50	14,1	12,8	13,2	12,5
50 bis unter 55	16,8	17,6	15,2	17,1
55 bis unter 60	19,6	24,5	17,7	22,8
60 bis unter 65	17,9	27,5	17,6	25,9
65 bis unter 70	5,5	11,4	9,7	11,9
70 bis unter 75	3,9	2,0	1,0	1,6
75 bis unter 80	1,2	1,8	0,2	1,8
80 und älter	1,9	1,6	2,4	4,3
Zusammen	11,7	11,1	11,2	10,7

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	4,5	0,0	0,0	0,0
15 bis unter 20	164,0	74,4	167,7	74,5
20 bis unter 25	172,5	92,9	179,1	96,0
25 bis unter 30	164,3	93,4	169,0	96,4
30 bis unter 35	206,0	120,8	212,3	126,8
35 bis unter 40	241,2	143,6	255,9	147,4
40 bis unter 45	282,7	165,1	290,4	168,7
45 bis unter 50	305,1	175,9	311,5	178,2
50 bis unter 55	328,7	183,8	335,5	191,7
55 bis unter 60	374,2	204,0	379,2	214,5
60 bis unter 65	359,0	211,1	399,5	233,9
65 bis unter 70	132,9	77,2	166,5	90,9
70 bis unter 75	7,8	1,6	4,0	2,5
75 bis unter 80	9,3	2,8	3,7	3,7
80 und älter	1,8	1,9	4,3	1,5
Zusammen	266,9	149,7	277,1	155,9
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	0,2	0,0	0,0	0,2
15 bis unter 20	33,3	19,1	35,2	20,3
20 bis unter 25	27,0	17,9	29,1	18,8
25 bis unter 30	22,4	15,8	23,5	15,8
30 bis unter 35	27,0	59,7	27,8	20,0
35 bis unter 40	34,6	25,4	34,4	25,1
40 bis unter 45	42,7	33,3	43,3	32,2
45 bis unter 50	49,9	37,8	49,1	38,7
50 bis unter 55	58,6	42,2	59,1	45,1
55 bis unter 60	57,8	53,9	56,7	54,8
60 bis unter 65	47,4	54,5	49,1	57,7
65 bis unter 70	17,5	21,8	20,1	20,3
70 bis unter 75	4,6	3,3	2,6	2,2
75 bis unter 80	4,4	2,9	5,8	5,9
80 und älter	0,6	2,1	3,1	6,7
Zusammen	41,0	36,7	41,5	32,8

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	0,0	0,0	0,0	0,0
15 bis unter 20	8,7	6,9	8,9	6,7
20 bis unter 25	5,8	5,3	5,8	5,2
25 bis unter 30	4,9	4,7	4,8	4,4
30 bis unter 35	5,2	5,7	5,4	5,8
35 bis unter 40	6,3	7,0	6,3	6,9
40 bis unter 45	7,6	8,6	7,2	8,4
45 bis unter 50	9,5	10,5	9,4	10,8
50 bis unter 55	12,6	13,7	12,4	14,0
55 bis unter 60	18,9	20,2	18,7	20,2
60 bis unter 65	21,6	23,3	21,8	23,8
65 bis unter 70	9,1	10,3	10,1	10,4
70 bis unter 75	4,4	4,4	3,9	3,6
75 bis unter 80	2,1	3,3	3,7	3,2
80 und älter	1,3	2,4	1,4	1,4
Zusammen	9,7	10,3	9,8	10,4
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	0,0	0,4	0,0	0,0
15 bis unter 20	17,2	12,7	16,3	11,7
20 bis unter 25	11,0	8,3	10,3	7,7
25 bis unter 30	8,5	6,7	8,5	6,3
30 bis unter 35	10,1	8,4	10,1	8,0
35 bis unter 40	11,7	10,1	11,7	9,3
40 bis unter 45	14,1	11,6	13,5	11,2
45 bis unter 50	15,1	12,0	14,7	12,1
50 bis unter 55	16,7	13,8	16,6	13,7
55 bis unter 60	19,7	15,9	18,0	15,7
60 bis unter 65	15,7	15,2	15,8	15,0
65 bis unter 70	6,6	4,8	6,0	4,9
70 bis unter 75	1,0	0,5	1,7	0,9
75 bis unter 80	0,5	1,1	0,8	1,8
80 und älter	0,0	0,1	0,1	0,4
Zusammen	13,6	11,1	13,3	10,8

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	0,0	0,0	1,0	0,2
15 bis unter 20	23,2	14,7	23,5	15,3
20 bis unter 25	16,0	12,6	14,8	12,3
25 bis unter 30	14,1	11,3	14,1	11,1
30 bis unter 35	17,8	16,6	17,9	16,5
35 bis unter 40	23,9	25,5	24,3	25,8
40 bis unter 45	37,3	45,2	37,1	44,6
45 bis unter 50	51,1	73,4	49,3	72,2
50 bis unter 55	70,6	118,2	66,5	116,6
55 bis unter 60	96,8	216,9	93,3	182,7
60 bis unter 65	113,9	227,9	115,1	245,8
65 bis unter 70	57,6	106,8	72,4	128,2
70 bis unter 75	16,7	19,4	11,9	20,8
75 bis unter 80	14,8	25,5	10,1	24,1
80 und älter	15,0	32,9	18,0	28,0
Zusammen	46,5	74,3	46,0	72,7
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	3,2	1,2	3,5	0,7
15 bis unter 20	496,3	406,6	440,6	357,9
20 bis unter 25	282,5	246,9	245,0	209,5
25 bis unter 30	208,8	176,4	176,8	147,7
30 bis unter 35	228,9	201,7	187,8	164,2
35 bis unter 40	243,8	219,0	195,1	170,5
40 bis unter 45	258,8	226,7	196,7	169,6
45 bis unter 50	261,1	219,9	196,1	160,9
50 bis unter 55	309,2	226,6	208,0	163,8
55 bis unter 60	310,1	246,0	230,8	183,4
60 bis unter 65	244,1	209,3	198,2	170,7
65 bis unter 70	85,6	66,8	71,1	62,9
70 bis unter 75	23,0	16,7	17,3	10,8
75 bis unter 80	12,0	8,7	7,0	8,6
80 und älter	7,7	11,2	4,7	11,5
Zusammen	263,4	220,0	204,4	171,6

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	0,6	0,1	0,2	0,1
15 bis unter 20	175,7	131,1	170,2	129,0
20 bis unter 25	95,0	88,3	93,8	85,9
25 bis unter 30	56,3	60,8	55,6	59,0
30 bis unter 35	53,6	62,8	52,9	63,6
35 bis unter 40	57,2	69,3	56,4	68,7
40 bis unter 45	66,1	80,4	65,6	79,0
45 bis unter 50	73,7	87,5	72,1	86,3
50 bis unter 55	79,7	96,7	79,7	95,4
55 bis unter 60	88,4	107,8	86,4	106,1
60 bis unter 65	74,1	92,7	76,3	96,0
65 bis unter 70	30,2	34,7	31,7	39,5
70 bis unter 75	8,3	8,9	8,0	7,6
75 bis unter 80	3,7	9,5	5,0	6,2
80 und älter	1,2	9,1	3,3	7,6
Zusammen	72,0	82,4	71,2	81,4
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	0,0	0,0	0,0	0,0
15 bis unter 20	34,5	46,1	34,7	47,6
20 bis unter 25	19,1	32,0	19,1	31,3
25 bis unter 30	11,9	21,4	12,4	21,4
30 bis unter 35	11,5	19,9	11,3	20,1
35 bis unter 40	12,5	20,1	12,4	19,0
40 bis unter 45	15,8	21,3	15,6	21,6
45 bis unter 50	17,3	22,6	17,2	22,6
50 bis unter 55	18,7	23,9	18,4	24,4
55 bis unter 60	20,8	26,6	20,5	26,9
60 bis unter 65	17,2	24,3	19,0	24,7
65 bis unter 70	4,2	7,8	7,5	8,6
70 bis unter 75	1,2	1,0	0,3	1,2
75 bis unter 80	1,1	2,1	0,4	2,2
80 und älter	0,1	2,9	1,0	2,5
Zusammen	16,2	23,5	16,2	23,5

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	0,4	0,1	0,2	0,0
15 bis unter 20	143,0	145,6	142,2	149,1
20 bis unter 25	122,6	157,5	125,5	163,0
25 bis unter 30	107,1	147,7	111,5	152,8
30 bis unter 35	134,9	197,4	140,4	204,2
35 bis unter 40	197,3	272,1	201,7	276,1
40 bis unter 45	290,3	363,9	301,5	371,1
45 bis unter 50	412,2	427,7	381,2	440,4
50 bis unter 55	473,1	513,6	479,3	528,6
55 bis unter 60	572,1	667,8	569,2	661,7
60 bis unter 65	591,9	731,0	627,7	774,1
65 bis unter 70	249,3	267,4	260,2	306,5
70 bis unter 75	36,0	24,9	30,0	24,7
75 bis unter 80	22,0	24,0	21,1	19,3
80 und älter	16,4	15,9	13,9	16,3
Zusammen	314,6	364,1	318,9	374,7
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	0,0	0,0	0,6	0,0
15 bis unter 20	59,6	9,9	57,0	8,9
20 bis unter 25	35,0	8,5	33,3	8,2
25 bis unter 30	27,1	7,4	27,2	7,0
30 bis unter 35	30,2	9,1	30,5	8,9
35 bis unter 40	33,8	11,4	32,5	11,1
40 bis unter 45	40,0	14,3	38,0	14,0
45 bis unter 50	43,9	16,7	41,0	17,1
50 bis unter 55	42,5	20,7	39,4	20,3
55 bis unter 60	38,7	27,7	36,7	27,1
60 bis unter 65	32,8	30,3	31,7	30,2
65 bis unter 70	12,7	12,3	15,7	14,9
70 bis unter 75	3,2	4,9	3,2	5,3
75 bis unter 80	2,7	7,1	2,6	5,3
80 und älter	2,6	4,0	2,1	4,6
Zusammen	36,6	15,4	35,0	15,2

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett				
bis unter 15	0,0		0,0	
15 bis unter 20	18,4		16,9	
20 bis unter 25	35,6		35,0	
25 bis unter 30	60,9		63,0	
30 bis unter 35	72,6		78,4	
35 bis unter 40	42,6		47,1	
40 bis unter 45	10,1		10,9	
45 bis unter 50	0,9		1,0	
50 bis unter 55	0,3		0,3	
55 bis unter 60	0,2		0,2	
60 bis unter 65	0,2		0,2	
65 bis unter 70	0,0		0,0	
70 bis unter 75	0,0		0,0	
75 bis unter 80	0,0		0,0	
80 und älter	0,0		0,0	
Zusammen	24,6		26,0	
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben				
bis unter 15	0,0	0,0	0,0	0,0
15 bis unter 20	0,1	0,0	0,1	0,1
20 bis unter 25	0,1	0,1	0,1	0,0
25 bis unter 30	0,2	0,0	0,2	0,0
30 bis unter 35	0,3	0,1	0,3	0,0
35 bis unter 40	0,2	0,0	0,2	0,0
40 bis unter 45	0,1	0,0	0,1	0,0
45 bis unter 50	0,0	0,0	0,0	0,1
50 bis unter 55	0,0	0,0	0,1	0,0
55 bis unter 60	0,1	0,1	0,1	0,1
60 bis unter 65	0,0	0,1	0,0	0,0
65 bis unter 70	0,0	0,0	0,0	0,0
70 bis unter 75	0,0	0,0	0,0	0,0
75 bis unter 80	0,0	0,0	0,0	0,0
80 und älter	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	0,1	0,0	0,1	0,0

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien				
bis unter 15	0,0	0,0	0,0	0,0
15 bis unter 20	4,8	4,3	5,2	4,2
20 bis unter 25	4,2	2,8	4,2	3,0
25 bis unter 30	3,3	1,9	3,0	1,9
30 bis unter 35	2,8	2,1	2,6	1,9
35 bis unter 40	2,8	2,0	2,7	2,0
40 bis unter 45	2,9	2,3	3,0	2,3
45 bis unter 50	3,3	2,1	3,0	2,4
50 bis unter 55	3,4	2,4	3,3	2,4
55 bis unter 60	3,5	2,5	3,7	2,4
60 bis unter 65	3,8	2,6	3,3	2,9
65 bis unter 70	0,5	0,9	1,1	0,9
70 bis unter 75	0,0	0,2	0,2	0,5
75 bis unter 80	0,0	0,1	0,0	0,0
80 und älter	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	3,3	2,3	3,2	2,3
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	0,9	0,0	0,1	0,1
15 bis unter 20	127,5	79,9	130,9	80,4
20 bis unter 25	73,6	49,2	74,4	49,8
25 bis unter 30	54,2	33,6	55,4	32,8
30 bis unter 35	58,1	36,4	59,0	35,9
35 bis unter 40	61,9	42,6	62,7	41,1
40 bis unter 45	66,9	49,1	66,3	47,2
45 bis unter 50	70,6	54,5	70,4	52,0
50 bis unter 55	76,2	62,8	74,9	60,8
55 bis unter 60	84,8	78,5	81,5	74,7
60 bis unter 65	80,8	82,3	80,9	81,3
65 bis unter 70	43,8	39,2	39,3	34,1
70 bis unter 75	8,4	10,5	6,2	9,0
75 bis unter 80	6,3	11,0	7,3	10,0
80 und älter	8,3	18,7	10,5	21,2
Zusammen	69,5	52,9	69,4	51,5

Altersgruppe	2013		2014	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	0,6	0,2	0,0	0,1
15 bis unter 20	149,6	327,6	142,5	315,6
20 bis unter 25	88,3	216,1	85,9	204,0
25 bis unter 30	59,2	136,0	57,6	129,0
30 bis unter 35	60,2	121,7	56,2	117,8
35 bis unter 40	71,9	122,0	65,8	113,1
40 bis unter 45	91,9	132,8	85,1	124,9
45 bis unter 50	107,1	138,3	100,1	128,2
50 bis unter 55	130,9	141,3	120,1	131,9
55 bis unter 60	160,3	144,6	145,8	135,3
60 bis unter 65	152,9	128,5	144,9	125,9
65 bis unter 70	80,3	55,4	74,8	54,1
70 bis unter 75	24,7	16,5	25,5	15,0
75 bis unter 80	27,1	11,5	16,1	16,3
80 und älter	14,0	14,7	11,1	14,7
Zusammen	101,0	143,9	94,6	135,5

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	0,7	1,0	301,2	82,5
15 bis unter 20	199,6	178,9	131,0	130,3
20 bis unter 25	108,4	108,1	105,0	103,7
25 bis unter 30	67,5	68,0	71,5	71,3
30 bis unter 35	65,1	68,1	68,4	72,6
35 bis unter 40	65,5	67,6	67,5	71,1
40 bis unter 45	66,8	66,0	67,9	67,8
45 bis unter 50	67,8	63,7	67,8	64,9
50 bis unter 55	70,3	63,6	71,6	63,7
55 bis unter 60	74,8	65,5	75,6	65,7
60 bis unter 65	67,6	60,7	71,7	62,0
65 bis unter 70	29,3	21,0	35,1	23,6
70 bis unter 75	4,2	4,2	3,6	3,5
75 bis unter 80	4,0	4,0	3,2	1,8
80 und älter	1,1	6,6	3,9	6,0
Zusammen	72,9	71,0	73,9	72,0
II. Neubildungen				
bis unter 15	0,0	0,0	131,7	0,0
15 bis unter 20	7,5	9,0	5,5	6,1
20 bis unter 25	9,7	10,0	9,4	9,0
25 bis unter 30	12,8	10,6	13,7	10,2
30 bis unter 35	23,2	14,3	25,8	14,4
35 bis unter 40	40,5	18,6	43,1	18,8
40 bis unter 45	73,1	28,1	74,6	28,8
45 bis unter 50	106,7	43,5	112,9	46,2
50 bis unter 55	140,8	74,7	149,0	80,1
55 bis unter 60	153,9	128,9	160,2	132,4
60 bis unter 65	185,0	179,8	195,0	196,5
65 bis unter 70	121,4	111,0	155,2	112,7
70 bis unter 75	13,3	15,2	10,7	7,2
75 bis unter 80	5,6	14,0	7,1	8,7
80 und älter	8,0	11,3	7,1	13,2
Zusammen	81,5	50,3	85,5	52,7

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,0	0,0	1,8	0,0
15 bis unter 20	2,4	1,4	1,4	0,7
20 bis unter 25	1,9	1,1	1,9	1,1
25 bis unter 30	1,8	1,2	1,7	1,2
30 bis unter 35	2,4	1,5	2,3	1,4
35 bis unter 40	3,0	1,8	3,0	2,0
40 bis unter 45	3,7	2,5	3,7	2,1
45 bis unter 50	4,2	2,8	4,4	2,6
50 bis unter 55	4,4	3,6	4,2	3,4
55 bis unter 60	4,1	4,4	4,2	4,5
60 bis unter 65	4,6	5,6	4,9	5,5
65 bis unter 70	4,0	2,5	3,6	3,4
70 bis unter 75	0,4	0,2	0,4	0,1
75 bis unter 80	0,6	0,5	0,1	0,5
80 und älter	0,0	1,4	0,2	0,2
Zusammen	3,4	2,6	3,3	2,5
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	0,0	0,0	2,1	0,0
15 bis unter 20	5,6	3,6	3,8	2,5
20 bis unter 25	5,8	3,5	5,2	3,1
25 bis unter 30	6,1	2,8	6,1	3,3
30 bis unter 35	8,1	4,6	8,3	4,7
35 bis unter 40	10,8	7,1	10,3	6,7
40 bis unter 45	13,6	10,0	13,0	10,0
45 bis unter 50	14,9	14,2	15,9	14,6
50 bis unter 55	17,5	20,5	17,8	19,0
55 bis unter 60	20,0	26,6	18,6	26,4
60 bis unter 65	21,1	31,8	20,1	31,2
65 bis unter 70	11,4	13,9	11,6	13,1
70 bis unter 75	1,9	1,7	0,9	0,5
75 bis unter 80	1,0	2,0	3,1	1,4
80 und älter	6,8	3,5	0,0	0,6
Zusammen	12,9	12,4	12,7	12,2

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	0,3	0,0	281,2	85,0
15 bis unter 20	190,5	89,5	126,6	65,6
20 bis unter 25	208,0	121,0	196,8	117,8
25 bis unter 30	206,9	121,6	207,0	128,6
30 bis unter 35	270,5	162,1	269,9	168,9
35 bis unter 40	316,8	194,0	321,0	208,3
40 bis unter 45	360,9	220,2	369,5	231,1
45 bis unter 50	385,7	236,4	404,3	253,9
50 bis unter 55	417,7	245,9	440,5	272,0
55 bis unter 60	465,8	274,0	484,5	296,4
60 bis unter 65	513,9	305,0	551,5	335,9
65 bis unter 70	198,8	102,4	251,5	121,1
70 bis unter 75	8,4	3,6	4,4	2,2
75 bis unter 80	5,9	2,2	6,0	0,8
80 und älter	3,5	2,1	1,4	2,3
Zusammen	344,4	200,9	353,3	213,2
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	0,0	0,0	41,6	0,0
15 bis unter 20	36,2	20,4	22,0	15,1
20 bis unter 25	32,0	20,1	29,9	18,8
25 bis unter 30	26,3	18,1	28,1	19,2
30 bis unter 35	31,5	22,9	33,1	24,2
35 bis unter 40	39,4	30,0	41,2	31,9
40 bis unter 45	50,2	39,0	50,3	41,4
45 bis unter 50	56,7	47,4	60,9	46,6
50 bis unter 55	67,9	54,5	70,3	56,6
55 bis unter 60	66,9	65,6	70,4	68,7
60 bis unter 65	62,7	75,1	65,9	77,1
65 bis unter 70	27,9	29,2	35,2	28,4
70 bis unter 75	2,9	3,4	2,3	1,6
75 bis unter 80	3,1	2,7	1,1	1,4
80 und älter	2,2	8,1	1,4	1,9
Zusammen	48,2	39,3	49,8	40,3

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	1,1	0,3	22,1	0,0
15 bis unter 20	8,5	6,8	5,0	4,6
20 bis unter 25	5,9	5,5	6,0	4,9
25 bis unter 30	5,3	4,7	5,3	5,1
30 bis unter 35	6,0	6,0	5,7	6,5
35 bis unter 40	6,9	7,5	6,7	7,9
40 bis unter 45	7,9	9,5	7,8	9,3
45 bis unter 50	10,4	11,8	10,5	12,1
50 bis unter 55	14,4	15,8	13,9	16,5
55 bis unter 60	20,7	23,7	20,9	23,9
60 bis unter 65	27,6	29,2	29,0	31,0
65 bis unter 70	17,1	11,1	17,2	13,3
70 bis unter 75	5,1	3,5	3,5	1,3
75 bis unter 80	3,1	3,9	2,4	2,1
80 und älter	2,4	2,4	3,3	1,5
Zusammen	11,2	11,7	11,2	12,0
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	0,0	0,0	12,7	0,0
15 bis unter 20	17,3	12,8	10,6	8,8
20 bis unter 25	11,1	8,3	10,3	7,4
25 bis unter 30	9,2	6,8	9,4	6,8
30 bis unter 35	10,9	8,9	10,8	9,2
35 bis unter 40	12,9	10,8	12,9	11,1
40 bis unter 45	15,1	12,8	15,0	12,4
45 bis unter 50	16,7	13,8	17,6	14,2
50 bis unter 55	18,5	16,0	19,3	16,0
55 bis unter 60	20,8	18,6	21,4	18,5
60 bis unter 65	21,1	19,3	21,9	20,1
65 bis unter 70	6,0	6,0	8,4	5,7
70 bis unter 75	2,9	0,6	1,9	0,7
75 bis unter 80	1,3	0,7	0,9	0,6
80 und älter	1,4	0,6	1,4	0,1
Zusammen	15,0	12,4	15,2	12,3

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	0,0	0,0	63,7	80,0
15 bis unter 20	21,8	15,8	13,1	10,7
20 bis unter 25	16,0	12,9	14,9	12,2
25 bis unter 30	15,8	13,0	15,7	12,9
30 bis unter 35	20,0	19,1	20,1	19,5
35 bis unter 40	26,8	30,1	27,7	32,4
40 bis unter 45	40,5	51,6	39,9	55,5
45 bis unter 50	57,3	87,1	59,4	90,7
50 bis unter 55	75,6	140,7	78,0	147,8
55 bis unter 60	102,1	226,8	104,3	233,9
60 bis unter 65	141,8	305,4	147,5	325,2
65 bis unter 70	84,3	151,8	105,6	158,3
70 bis unter 75	14,0	22,4	10,0	10,2
75 bis unter 80	18,0	21,0	11,0	9,0
80 und älter	8,2	28,8	7,8	11,3
Zusammen	52,7	88,0	54,0	91,8
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	4,2	3,9	973,8	401,8
15 bis unter 20	501,2	419,5	303,0	281,2
20 bis unter 25	287,8	249,4	264,3	225,3
25 bis unter 30	214,5	177,9	215,3	177,4
30 bis unter 35	230,2	202,8	227,3	198,9
35 bis unter 40	246,4	216,6	235,5	208,0
40 bis unter 45	262,7	226,8	242,1	208,4
45 bis unter 50	269,9	225,7	248,4	207,8
50 bis unter 55	289,0	235,3	265,4	217,2
55 bis unter 60	318,5	260,0	293,4	241,9
60 bis unter 65	290,6	247,9	287,6	242,5
65 bis unter 70	118,2	89,0	135,4	89,2
70 bis unter 75	22,6	16,5	16,6	9,2
75 bis unter 80	12,5	11,8	8,8	5,1
80 und älter	2,6	12,5	9,3	11,1
Zusammen	268,1	226,2	251,5	211,8

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	0,0	0,2	254,8	80,4
15 bis unter 20	160,8	124,9	98,6	85,7
20 bis unter 25	94,0	87,3	84,1	78,3
25 bis unter 30	58,9	62,8	59,0	61,9
30 bis unter 35	57,6	68,2	56,5	67,4
35 bis unter 40	61,2	75,2	61,6	76,6
40 bis unter 45	70,5	86,5	69,6	86,6
45 bis unter 50	78,7	97,9	79,2	97,4
50 bis unter 55	86,3	110,2	87,5	110,7
55 bis unter 60	95,2	120,9	94,6	121,4
60 bis unter 65	89,6	114,1	94,0	119,5
65 bis unter 70	33,9	42,3	44,5	45,6
70 bis unter 75	4,7	9,0	4,0	3,8
75 bis unter 80	5,1	5,9	2,1	3,6
80 und älter	3,9	7,7	4,3	4,8
Zusammen	76,8	90,0	75,7	88,8
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	0,8	0,0	54,4	80,0
15 bis unter 20	33,5	48,6	20,9	34,2
20 bis unter 25	20,1	34,7	18,7	32,4
25 bis unter 30	13,2	23,6	13,9	24,2
30 bis unter 35	12,8	21,9	13,1	22,6
35 bis unter 40	13,3	22,1	14,0	22,6
40 bis unter 45	16,3	23,9	16,4	24,7
45 bis unter 50	19,0	26,0	19,5	26,3
50 bis unter 55	21,1	28,1	21,5	28,9
55 bis unter 60	22,4	31,1	23,5	32,6
60 bis unter 65	21,5	30,9	24,0	32,6
65 bis unter 70	7,8	10,2	10,2	11,4
70 bis unter 75	2,0	2,3	2,4	0,6
75 bis unter 80	0,4	2,0	0,7	0,4
80 und älter	0,1	0,3	0,7	2,2
Zusammen	17,7	26,7	18,1	27,0

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	1,1	1,8	603,3	161,2
15 bis unter 20	141,8	151,9	90,2	104,0
20 bis unter 25	133,5	172,9	124,7	159,2
25 bis unter 30	125,7	175,3	129,3	176,0
30 bis unter 35	161,2	234,6	164,3	236,8
35 bis unter 40	233,3	322,6	232,7	328,2
40 bis unter 45	347,9	433,6	346,8	441,5
45 bis unter 50	444,2	525,4	465,2	544,4
50 bis unter 55	563,3	632,9	583,1	666,4
55 bis unter 60	667,7	796,2	686,4	833,2
60 bis unter 65	764,7	954,2	814,9	1.013,2
65 bis unter 70	354,3	355,6	410,6	375,1
70 bis unter 75	38,9	27,9	25,9	15,5
75 bis unter 80	20,7	22,6	14,1	14,2
80 und älter	10,3	12,4	4,1	8,5
Zusammen	374,3	442,7	384,1	454,3
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	0,2	0,3	139,8	0,0
15 bis unter 20	53,9	9,1	32,9	6,6
20 bis unter 25	33,3	8,5	30,0	7,7
25 bis unter 30	28,0	7,7	27,7	7,8
30 bis unter 35	32,5	9,7	31,8	9,8
35 bis unter 40	35,8	12,6	34,5	12,3
40 bis unter 45	40,5	15,8	40,2	16,3
45 bis unter 50	44,4	19,1	44,7	19,0
50 bis unter 55	43,1	23,5	43,1	24,5
55 bis unter 60	39,4	32,3	39,7	31,8
60 bis unter 65	38,5	36,6	39,7	38,0
65 bis unter 70	19,2	17,1	19,9	19,1
70 bis unter 75	3,7	4,4	2,8	2,2
75 bis unter 80	5,2	2,9	2,3	1,1
80 und älter	0,4	4,7	0,6	1,1
Zusammen	37,6	17,3	36,8	17,4

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett				
bis unter 15	0,0		215,3	
15 bis unter 20	16,4		9,3	
20 bis unter 25	35,9		31,6	
25 bis unter 30	67,3		65,4	
30 bis unter 35	81,4		80,0	
35 bis unter 40	48,7		48,7	
40 bis unter 45	11,9		13,2	
45 bis unter 50	1,3		1,3	
50 bis unter 55	0,6		0,5	
55 bis unter 60	0,5		0,5	
60 bis unter 65	0,3		0,4	
65 bis unter 70	0,2		0,6	
70 bis unter 75	0,0		0,0	
75 bis unter 80	0,0		0,0	
80 und älter	0,0		0,0	
Zusammen	27,4		26,6	
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben				
bis unter 15	0,0	0,0	0,1	0,0
15 bis unter 20	0,1	0,0	0,0	0,0
20 bis unter 25	0,1	0,0	0,1	0,0
25 bis unter 30	0,2	0,0	0,2	0,0
30 bis unter 35	0,3	0,0	0,3	0,0
35 bis unter 40	0,3	0,0	0,3	0,0
40 bis unter 45	0,1	0,0	0,1	0,0
45 bis unter 50	0,1	0,0	0,1	0,1
50 bis unter 55	0,1	0,1	0,1	0,0
55 bis unter 60	0,1	0,1	0,1	0,1
60 bis unter 65	0,0	0,0	0,0	0,1
65 bis unter 70	0,0	0,0	0,0	0,0
70 bis unter 75	0,0	0,0	0,0	0,0
75 bis unter 80	0,0	0,0	0,0	0,0
80 und älter	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	0,1	0,0	0,1	0,0

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien				
bis unter 15	0,0	0,0	11,5	0,0
15 bis unter 20	5,6	3,8	3,5	2,4
20 bis unter 25	4,5	3,2	4,7	2,6
25 bis unter 30	3,5	2,4	3,8	2,4
30 bis unter 35	3,4	2,4	3,3	2,3
35 bis unter 40	3,6	2,2	4,1	2,5
40 bis unter 45	3,6	2,5	3,9	2,6
45 bis unter 50	4,0	2,7	3,9	2,8
50 bis unter 55	4,2	3,1	4,3	2,9
55 bis unter 60	4,0	3,0	4,3	3,5
60 bis unter 65	3,8	3,5	3,9	3,3
65 bis unter 70	1,4	0,6	2,4	1,1
70 bis unter 75	1,1	0,2	0,8	0,0
75 bis unter 80	0,0	0,1	0,1	0,2
80 und älter	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	3,9	2,7	4,0	2,7
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	1,5	0,7	212,8	80,5
15 bis unter 20	133,7	85,3	85,7	60,3
20 bis unter 25	81,3	55,9	78,2	53,7
25 bis unter 30	62,2	38,0	64,7	40,4
30 bis unter 35	68,2	42,5	70,4	44,0
35 bis unter 40	72,8	49,9	74,3	52,6
40 bis unter 45	77,2	57,8	80,5	60,9
45 bis unter 50	82,0	65,3	86,5	70,0
50 bis unter 55	88,9	77,2	93,9	81,0
55 bis unter 60	97,9	95,7	104,1	101,2
60 bis unter 65	100,5	107,1	113,0	118,3
65 bis unter 70	55,0	54,1	65,2	53,9
70 bis unter 75	7,9	9,7	3,7	4,3
75 bis unter 80	7,0	9,7	4,8	3,9
80 und älter	3,4	18,1	2,4	9,2
Zusammen	80,9	63,3	84,1	66,1

Altersgruppe	2015		2016	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	0,1	3,0	298,1	400,2
15 bis unter 20	145,4	317,9	100,7	243,2
20 bis unter 25	94,1	222,4	98,7	223,3
25 bis unter 30	66,6	148,1	74,6	163,9
30 bis unter 35	66,3	136,9	73,1	157,5
35 bis unter 40	76,9	135,0	84,0	165,9
40 bis unter 45	97,4	149,4	106,7	181,1
45 bis unter 50	116,4	154,2	129,3	193,2
50 bis unter 55	142,8	158,5	160,7	200,7
55 bis unter 60	173,0	166,1	193,2	214,1
60 bis unter 65	178,9	159,4	205,2	200,6
65 bis unter 70	101,5	73,3	122,1	87,6
70 bis unter 75	32,5	18,4	22,4	8,1
75 bis unter 80	16,3	15,9	12,8	6,9
80 und älter	15,1	11,7	13,0	14,5
Zusammen	111,1	158,9	122,9	187,0

Datenquelle: KG8